

Апизартрон



Код АТХ:

- [M02AC](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

Форма выпуска:

◇ **Мазь для наружного применения** от белого до слегка желтоватого цвета, однородной консистенции, с запахом метилсалицилата.

	100 г
яд пчелиный	3 мг
метилсалицилат	10 г
аллилизотиоцианат	1 г

Вспомогательные вещества: натрия лаурилсульфат - 700 мг, вазелин белый - 6 г, эмульгированный цетостеариловый спирт - 14 мг (натрия цетилстеарилсульфат - 1.4 г, цетостеариловый спирт - 12.6 г), вода - до 100 г.

20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат на основе пчелиного яда для наружного применения.

Оказывает местное раздражающее действие благодаря стимуляции периферических нервных окончаний. Оказывает прямое сосудорасширяющее действие, что приводит к улучшению снабжения тканей кислородом; ускоряет распад вызывающих боль продуктов обмена веществ. Метилсалицилат и аллилизотиоцианат вызывают гиперемию кожи, оказывают анальгезирующий и разогревающий эффекты.

Апизартрон способствует активизации обмена веществ, повышению эластичности соединительной ткани и мышц, понижению тонуса мышц.

Действие развивается через несколько минут после нанесения препарата на область поражения.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Апизартрон не предоставлены.

Показания к применению:

- заболевания опорно-двигательного аппарата (остеоартроз, ревматическое поражение мягких тканей);
- артралгии (в т.ч. ревматические заболевания суставов);
- миалгии (в т.ч. связанные с перенапряжением);
- невралгии (в т.ч. невриты, ишиас);
- нарушения периферического кровообращения;
- болевой синдром при мягких поражениях мышц, сухожилий, связок, при ушибах и растяжениях;
- для разогревания мышц до и во время спортивных нагрузок.

Относится к болезням:

- [Артралгия](#)
- [Арритрит](#)
- [Артроз](#)
- [Болевой синдром](#)
- [Ишиас](#)
- [Миалгия](#)
- [Невралгия](#)
- [Неврит](#)
- [Остеоартрит](#)
- [Остеоартроз](#)
- [Растяжение](#)
- [Ревматизм](#)
- [Ревматические заболевания](#)
- [Ушиб](#)

Противопоказания:

- хроническая почечная недостаточность тяжелой степени;
- тяжелые заболевания печени;
- заболевания кожи;
- новообразования;
- угнетение костномозгового кроветворения;
- психические заболевания;
- острый артрит;
- детский возраст до 12 лет;
- повышенная чувствительность к пчелиному яду, салицилатам, изотиацианатам.

Способ применения и дозы:

Полоску мази длиной 3–5 см распределяют в области поражения до слоя толщиной примерно 1 мм и оставляют на 2–3 мин (в зависимости от реактивной способности организма) до появления реакции на нанесение препарата (покраснение, чувство тепла). Затем медленно и интенсивно втирают мазь в кожу. Для усиления лечебного действия рекомендуется держать обработанные области тела в тепле. Как правило, мазь Апизартрон применяют 2–3 раза/сут до исчезновения симптомов заболеваний.

После нанесения Апизартрона руки следует тщательно вымыть водой с мылом.

Побочное действие:

Аллергические реакции: редко - кожная сыпь, зуд в области нанесения мази.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Апизартрон не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применение мази Апизартрон при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Апизартрон не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не следует наносить на поврежденную и раздраженную кожу, а также на участки, пораженные кожным заболеванием.

У пациентов с почечной недостаточностью Апизартрон не следует применять на обширных поверхностях кожи в течение длительного времени.

Не допускать контакта мази с глазами, слизистыми оболочками и открытыми ранами.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при хронической почечной недостаточности тяжелой степени.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при тяжелых заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Препарат не следует использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Apizartron>