Аралии настойка



Код АТХ:

- A13A

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Аралии маньчжурской корни

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Содержит тритерпеновые сапонины - аралозиды, следы алкалоидов, эфирное масло, гликозиды, жирные кислоты, аскорбиновую кислоту, витамины B1, B2.

Стимулирует ЦНС (по активности превосходит настойку женьшеня), оказывает общетонизирующее, гипертензивное и гипогликемическое действие. Улучшает аппетит, сон, ослабляет чувство усталости, укрепляет нервную систему. Активизирует окислительно-восстановительные процессы в тканях, глюкокортикоидосинтезирующую функцию надпочечников, повышает фагоцитарную активность лейкоцитов и сопротивляемость организма.

Показания к применению:

Артериальная гипотензия, астения, снижение либидо, неврастения, депрессия; состояние после перенесенного менингита, ЧМТ, контузии; ОРВИ (в составе комплексной терапии), энурез, постгриппозный арахноидит, лучевая болезнь; физическое и психическое переутомление; пародонтоз, зубная боль.

Относится к болезням:

- Астения
- Гипотензия
- Депрессия
- Зубная боль

- Менингит
- Неврит
- Пародонтит
- Энурез

Противопоказания:

Повышенная возбудимость, бессонница, артериальная гипертензия, эпилепсия, гиперкинез, повышенная чувствительность к растению.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь в виде настойки 2 раза/сут после еды (утром и в середине дня); курс лечения - 15-30 дней. Местно применяют для полоскания полости рта при зубной боли в виде 20% отвара.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции, бессонница, тахикардия, повышение АД, эйфория.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется принимать в вечерние часы (во избежание развития нарушений ночного сна).

Источник: http://drugs.thead.ru/Aralii_nastoyka