

[Араноза](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противоопухолевое средство (алкилирующее соединение). Подавляет синтез ДНК в опухолевых клетках. Преимущество перед аналогами (производными нитрозомочевины) - большая широта терапевтических доз и возможность применения в амбулаторных условиях.

Показания к применению:

— меланома кожи.

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- общее тяжелое состояние больного;
- лейкопения (ниже 3 000/мкл);
- тромбоцитопения (ниже 120 000/мкл);
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в фазе обострения);
- сердечно-сосудистые и неврологические заболевания;
- нарушения функции печени и почек;
- беременность.

Способ применения и дозы:

Препарат вводят в/в струйно, ежедневно или через день в разовой дозе, определяемой из расчета 0.55-0.8 г/м² поверхности тела больного (в среднем 1-1.5 г). Курс лечения - 3.0-4.5 г (3 инъекции).

Раствор готовят непосредственно перед введением, растворяя содержимое флакона в 20 мл 5% раствора декстрозы.

Араноза

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Повторные курсы проводят с интервалом в 4 нед (при отсутствии проявлений токсичности).

Побочное действие:

Со стороны системы кроветворения: лейкопения, тромбоцитопения, эритропения.

Прочие: нарушение функции ЖКТ; иммунодепрессия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано при беременности.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение в комбинации с другими противоопухолевыми препаратами приводит к повышению эффективности при лечении диссеминированной меланомы кожи и не сопровождается усилением токсичности.

Особые указания и меры предосторожности:

Лечение проводят под контролем содержания лейкоцитов, тромбоцитов, эритроцитов в крови. Следует иметь в виду, что гематотоксичность может проявляться через 1-3 нед после окончания курса лечения.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при нарушениях функции почек.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при нарушениях функции печени.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Aranoza>