

Арфазетин-Э



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Зверобоя продырявленного трава](#)
- [Ромашки аптечной цветки](#)
- [Фасоли обыкновенной створки плодов](#)
- [Хвоща полевого трава](#)
- [Черники обыкновенной побеги](#)
- [Шиповника плоды](#)
- [Элеутерококка колючего корневища и корни](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) мнн мнн мнн мнн мнн мнн мнн [Википедия](#) мнн мнн мнн мнн мнн мнн мнн
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#) англ

Форма выпуска:

| ◇ Сбор растительный - порошок | 1 фильтр-пакет |
|--------------------------------------|-----------------------|
| трава зверобоя продырявленного | 10% |
| цветки ромашки аптечной | 10% |
| створки плодов фасоли обыкновенной | 20% |
| трава хвоща полевого | 10% |
| побеги черники | 20% |
| плоды шиповника | 15% |
| корневища с корнями элеутерококка | 15% |

2 г - фильтр-пакеты (10) - пачки картонные.

| ◇ Сбор растительный - сырье измельченное | 1 пачка |
|---|----------------|
| трава зверобоя продырявленного | 10% |
| цветки ромашки аптечной | 10% |
| створки плодов фасоли обыкновенной | 20% |
| трава хвоща полевого | 10% |
| побеги черники | 20% |
| плоды шиповника | 15% |
| корневища с корнями элеутерококка | 15% |

Пакеты бумажные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

[1] - Инструкция по медицинскому применению одобрена фармакологическим комитетом МЗ РФ

Настой сбора обладает гипогликемическим действием, способствует снижению содержания глюкозы в крови, увеличивает толерантность к углеводам и усиливает гликогенообразующую функцию печени.

Показания к применению:

— сахарный диабет 2 типа (инсулиннезависимый): при легкой форме - в качестве средства самостоятельной терапии, при диабете средней тяжести - в сочетании с пероральными гипогликемическими препаратами или инсулином.

Относится к болезням:

- [Гипогликемия](#)
- [Инсулинома](#)
- [Инсульт](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- нефрит;
- артериальная гипертензия;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- повышенная возбудимость;
- бессонница;
- эпилепсия.

Способ применения и дозы:

Около 5 г (1 ст.л.) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь в теплом виде по 1/3—1/2 стакана 2-3 раза/сут за 30 мин до еды, в течение 20-30 дней. Через 10-15 дней курс лечения рекомендуется повторить. В течение года проводят 3-4 курса (по согласованию с лечащим врачом).

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, изжога, повышение АД, нарушение сна.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение сбора Арфазетин-Э необходимо согласовать с лечащим врачом.

При применении настоя в сочетании с антидиабетическими препаратами необходимо соблюдать правила приема, меры предосторожности и противопоказания, предусмотренные для этих препаратов. Не рекомендуется применять Арфазетин-Э во второй половине дня во избежание нарушений сна.

Условия хранения:

Сбор хранить в сухом, защищенном от света месте. Приготовленный настой — в прохладном месте, не более 2-х сут.

Арфазетин-Э

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 2 г.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Arfazetin-E>