Арфазетин-Э



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Зверобоя продырявленного трава
- Ромашки аптечной цветки
- Фасоли обыкновенной створки плодов
- Хвоща полевого трава
- Черники обыкновенной побеги
- Шиповника плоды
- Элеутерококка колючего корневища и корни

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн мнн мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн мнн мнн мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сбор растительный - порошок***	**1 фильтр-пакет**
трава зверобоя продырявленного	10%
цветки ромашки аптечной	10%
створки плодов фасоли обыкновенной	20%
трава хвоща полевого	10%
побеги черники	20%
плоды шиповника	15%
корневища с корнями элеутерококка	15%

2 г - фильтр-пакеты (10) - пачки картонные.

◊ ***Сбор растительный - сырье измельченное***	**1 пачка**
трава зверобоя продырявленного	10%
цветки ромашки аптечной	10%
створки плодов фасоли обыкновенной	20%
трава хвоща полевого	10%
побеги черники	20%
плоды шиповника	15%
корневища с корнями элеутерококка	15%

Пакеты бумажные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

[I] - Инструкция по медицинскому применению одобрена фармакологическим комитетом МЗ РФ

Настой сбора обладает гипогликемическим действием, способствует снижению содержания глюкозы в крови, увеличивает толерантность к углеводам и усиливает гликогенобразующую функцию печени.

Показания к применению:

— сахарный диабет 2 типа (инсулиннезависимый): при легкой форме - в качестве средства самостоятельной терапии, при диабете средней тяжести - в сочетании с пероральными гипогликемическими препаратами или инсулином.

Относится к болезням:

- Гипогликемия
- Инсулинома
- Инсульт

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— нефрит;

— артериальная гипертензия;

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

— повышенная возбудимость;

— бессонница;

— эпилепсия.

Способ применения и дозы:

Около 5 г (1 ст.л.) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь в теплом виде по 1/3—1/2 стакана 2-3 раза/сут за 30 мин до еды, в течение 20-30 дней. Через 10-15 дней курс лечения рекомендуется повторить. В течение года проводят 3-4 курса (по согласованию с лечащим врачом).

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, изжога, повышение АД, нарушение сна.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение сбора Арфазетин-Э необходимо согласовать с лечащим врачом.

При применении настоя в сочетании с антидиабетическими препаратами необходимо соблюдать правила приема, меры предосторожности и противопоказания, предусмотренные для этих препаратов. Не рекомендуется применять Арфазетин-Э во второй половине дня во избежание нарушений сна.

Условия хранения:

Сбор хранить в сухом, защищенном от света месте. Приготовленный настой — в прохладном месте, не более 2-х сут.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 2 г.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Arfazetin-E