

Арфазетин-ЭК



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Зверобоя продырявленного трава](#)
- [Ромашки аптечной цветки](#)
- [Фасоли обыкновенной створки плодов](#)
- [Хвоща полевого трава](#)
- [Черники обыкновенной побеги](#)
- [Шиповника плоды](#)
- [Элеутерококка колючего корневища и корни](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) мнн мнн мнн мнн мнн мнн мнн [Википедия](#) мнн мнн мнн мнн мнн мнн мнн
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#) англ

Форма выпуска:

Сбор растительный - порошок	1 фильтр-пакет
трава зверобоя продырявленного	10%
цветки ромашки аптечной	10%
створки плодов фасоли обыкновенной	20%
трава хвоща полевого	10%
побеги черники	20%
плоды шиповника	15%
корневища с корнями элеутерококка	15%

2 г - фильтр-пакеты (10) - пачки картонные.

Сбор растительный - сырье измельченное	1 пачка
трава зверобоя продырявленного	10%
цветки ромашки аптечной	10%
створки плодов фасоли обыкновенной	20%
трава хвоща полевого	10%
побеги черники	20%
плоды шиповника	15%
корневища с корнями элеутерококка	15%

Пакеты бумажные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

[1] - Инструкция по медицинскому применению одобрена фармакологическим комитетом МЗ РФ

Настой сбора обладает гипогликемическим действием, способствует снижению содержания глюкозы в крови, увеличивает толерантность к углеводам и усиливает гликогенообразующую функцию печени.

Показания к применению:

— сахарный диабет 2 типа (инсулиннезависимый): при легкой форме - в качестве средства самостоятельной терапии, при диабете средней тяжести - в сочетании с пероральными гипогликемическими препаратами или инсулином.

Относится к болезням:

- [Гипогликемия](#)
- [Инсулинома](#)
- [Инсульт](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- нефрит;
- артериальная гипертензия;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- повышенная возбудимость;
- бессонница;
- эпилепсия.

Способ применения и дозы:

Около 5 г (1 ст.л.) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь в теплом виде по 1/3—1/2 стакана 2-3 раза/сут за 30 мин до еды, в течение 20-30 дней. Через 10-15 дней курс лечения рекомендуется повторить. В течение года проводят 3-4 курса (по согласованию с лечащим врачом).

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, изжога, повышение АД, нарушение сна.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение сбора Арфазетин-Э необходимо согласовать с лечащим врачом.

При применении настоя в сочетании с антидиабетическими препаратами необходимо соблюдать правила приема, меры предосторожности и противопоказания, предусмотренные для этих препаратов. Не рекомендуется применять Арфазетин-Э во второй половине дня во избежание нарушений сна.

Условия хранения:

Сбор хранить в сухом, защищенном от света месте. Приготовленный настой — в прохладном месте, не более 2-х сут.

Арфазетин-ЭК

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 2 г.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Arfazetin-EK>