

## Аргедин



### Код АТХ:

- [J01EC02](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Сульфадиазин серебра](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

Крем для наружного применения	1 г
сульфадиазин серебра	10 мг

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Сульфаниламидный препарат для наружного применения. Обладает широким спектром антибактериального действия, в который входят практически все грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, включая *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Proteus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Enterobacter spp.* и *Klebsiella spp.*, к нему также чувствительны некоторые виды грибов и дрожжей.

При нанесении на поврежденные кожные покровы диссоциирует с высвобождением ионов серебра и сульфаниламида, взаимодействует с сульфгидрильными группами ферментов бактериальной клетки и снижает их активность, в то же время не оказывает повреждающего действия на клетки тканей. Проникает в некротическую ткань. Действует бактериостатически.

#### Фармакокинетика

При нанесении на раневую поверхность в периферический и системный кровоток абсорбируется около 10% сульфадиазина и 1% серебра. Нанесение на обширную раневую поверхность сопровождается повышением концентрации сульфадиазина в крови до 10-20 мкг/мл.  $T_{1/2}$  10 часов.

## Показания к применению:

- инфицированные, поверхностные раны и ожоги со слабой экссудацией;
- пролежни;
- трофические и длительно не заживающие язвы (включая раны культя);
- ссадины;
- пересадка кожи.

## Относится к болезням:

- [Пролежни](#)
- [Раны](#)
- [Ссадины](#)

## Противопоказания:

- аллергические реакции на компоненты препарата, угнетение костномозгового кроветворения;
- дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
- почечная/печеночная недостаточность;
- порфирия;
- глубокие гнойные раны и ожоги с выраженной экссудацией;
- детский возраст до 2 лет.

## Способ применения и дозы:

Наружно. **Взрослым и детям старше 2 лет** поврежденную поверхность после очистки раны смазывают слоем крема толщиной 2 мм 2 раза в сутки; большие поврежденные поверхности кожи закрываются стерильной повязкой, сменяемой 2 раза в сутки, в серьезных случаях до 4 раз. При смене повязок не наблюдается болевых эффектов. Перед каждой повторной аппликацией необходимо удалить предыдущий слой препарата струей воды или антисептическим раствором. Курс лечения продолжать до заживления.

## Побочное действие:

Жжение, зуд, коричневатое-серое окрашивание кожи, кожные аллергические реакции (кожная сыпь, фотосенсибилизация); при длительном применении на больших раневых поверхностях - системные побочные эффекты (лейкопения, головная боль, диспепсия).

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности возможно только в тех случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода. В таких случаях применение препарата должно быть максимально непродолжительным и ограничиваться небольшими участками кожных покровов.

При необходимости применения в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Цимитидин - повышается риск развития лейкопении.

**Особые указания и меры предосторожности:**

Соли серебра, вступая в реакцию с кислородом воздуха, металлами и др. химическими компонентами, особенно при катализирующем тепловом воздействии, темнеют, поэтому препарат должен храниться в закрытой таре и вдали от источников тепла. Части тела, обработанные препаратом, рекомендуется предохранять от действия прямых солнечных лучей.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Не влияет.

**При нарушениях функции почек**

Противопоказано при почечной недостаточности.

**При нарушениях функции печени**

Противопоказано при печеночной недостаточности.

**Применение в детском возрасте**

Противопоказано детям до 2 лет.

**Условия хранения:**

При температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

2 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Argedin>