

## Арнигель



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Гель для наружного применения гомеопатический** прозрачный, однородный, от желтого до желто-оранжевого цвета, со слабым запахом.

	<b>100 г</b>
Arnica montana МТ (арника монтана)	7 г

*Вспомогательные вещества:* карбомер 0.9 г, натрия гидроксида р-р 10% 1.7 г, этанол 96% 20 г, вода очищенная 70.4 г.

45 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Показания к применению:

- ушибы;
- синяки;
- мышечная боль вследствие чрезмерной физической нагрузки

### Относится к болезням:

- [Ушиб](#)
- [Ушибы](#)

### Противопоказания:

- повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата;

- нарушение целостности кожных покровов;
- мокнущий дерматит;
- противопоказано наносить на слизистые оболочки;
- детский возраст до 1 года.

## **Способ применения и дозы:**

**Детям от 1 года и взрослым** небольшое количество геля нанести равномерным тонким слоем на кожу болезненных участков и втирать легкими массажными движениями до полного впитывания. Процедуру проводить 1-2 раза/сут в течение 5-7 дней.

## **Побочное действие:**

На настоящий момент информации о побочных действиях препарата не поступало. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу. *Возможны* аллергические реакции.

## **Передозировка:**

Случаи передозировки препаратом до настоящего времени не были зарегистрированы.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Возможно применение препарата только после консультации с врачом.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

На настоящий момент информация о взаимодействиях с другими лекарственными средствами отсутствует.

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Возможно появление сухости и раздражения кожи в связи с содержанием в препарате спирта этилового (этаноло).

Не рекомендуется нанесение геля под окклюзионную повязку.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора т.п.).

## **Условия хранения:**

Препарат хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15 до 25°C. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке

## **Срок годности:**

3 года.

## **Арнигель**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Arnigel>