Арнигель



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Гель для наружного применения гомеопатический*** прозрачный, однородный, от желтого до желто-оранжевого цвета, со слабым запахом.

	100 г
Arnica montana MT (арника монтана)	7 г

Вспомогательные вещества: карбомер 0.9 г, натрия гидроксида р-р 10% 1.7 г, этанол 96% 20 г, вода очищенная 70.4 г.

45 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Показания к применению:

— ушибы;

— синяки;

— мышечная боль вследствие чрезмерной физической нагрузки

Относится к болезням:

- Ушиб
- Ушибы

Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата;

— нарушение целостности кожных покровов;

— мокнущий дерматит;

— противопоказано наносить на слизистые оболочки;

— детский возраст до 1 года.

Способ применения и дозы:

Детям от 1 года и взрослым небольшое количество геля нанести равномерным тонким слоем на кожу болезненных участков и втирать легкими массажными движениями до полного впитывания. Процедуру проводить 1-2 раза/сут в течение 5-7 дней.

Побочное действие:

На настоящий момент информации о побочных действиях препарата не поступало. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу. *Возможны* аллергические реакции.

Передозировка:

Случаи передозировки препаратом до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата только после консультации с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

На настоящий момент информация о взаимодействиях с другими лекарственными средствами отсутствует.

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Возможно появление сухости и раздражения кожи в связи с содержанием в препарате спирта этилового (этанола).

Не рекомендуется нанесение геля под окклюзионную повязку.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущими механизмами, работа диспетчера и оператора т.п.).

Условия хранения:

Препарат хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15 до 25?С. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Arnigel