Артикаин-Бинергия



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Артикаин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Раствор для инъекций в виде бесцветной или бесцветной со слегка желтоватым оттенком прозрачной жидкости.

	1 мл
артикаина гидрохлорид (в пересчете на 100% вещество)	20 мг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 5.2 мг, вода д/и - до 1 мл.

1 мл - ампулы бесцветного стекла (5) - поддоны контурные пластиковые (1) - пачки картонные.
1 мл - ампулы бесцветного стекла (5) - поддоны контурные пластиковые (2) - пачки картонные.
2 мл - ампулы бесцветного стекла (5) - поддоны контурные пластиковые (1) - пачки картонные.
2 мл - ампулы бесцветного стекла (5) - поддоны контурные пластиковые (2) - пачки картонные.
5 мл - ампулы бесцветного стекла (5) - поддоны контурные пластиковые (1) - пачки картонные.
5 мл - ампулы бесцветного стекла (5) - поддоны контурные пластиковые (2) - пачки картонные.
10 мл - ампулы бесцветного стекла (5) - поддоны контурные пластиковые (1) - пачки картонные.
20 мл - ампулы бесцветного стекла (5) - поддоны контурные пластиковые (1) - коробки картонные.
10 мл - флаконы бесцветного стекла (5) - поддоны контурные пластиковые (1) - пачки картонные.
20 мл - флаконы бесцветного стекла (1) - пачки картонные.
40 мл - флаконы бесцветного стекла (1) - пачки картонные.
1.7 мл - картриджи бесцветного стекла (10) - поддоны контурные пластиковые (1) - пачки картонные.
1.7 мл - картриджи бесцветного стекла (10) - поддоны контурные пластиковые (5) - пачки картонные.
1.7 мл - картриджи бесцветного стекла (10) - поддоны контурные пластиковые (10) - пачки картонные.
1.8 мл - картриджи бесцветного стекла (10) - поддоны контурные пластиковые (1) - пачки картонные.
1.8 мл - картриджи бесцветного стекла (10) - поддоны контурные пластиковые (5) - пачки картонные.
1.8 мл - картриджи бесцветного стекла (10) - поддоны контурные пластиковые (10) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Местный анестетик амидного типа ряда тиафенов. Механизм действия обусловлен стабилизацией мембран нейронов и предотвращением возникновения и проведения нервного импульса. Анестезирующее действие развивается в течение 1-11 мин и продолжается в течение 60-225 мин.

Фармакокинетика

После в/м введения C_{max} активного вещества в плазме крови достигается через 20-40 мин. Полностью метаболизируется в печени. $T_{1/2}$ составляет 39.8±3.1 мин. Элиминация артикаина из тканей происходит быстро. Выводится главным образом почками - 54-63% за 6 ч.

Показания к применению:

Инфильтрационная и проводниковая анестезия для проведения хирургических и диагностических вмешательств, в акушерстве, при болевых синдромах.

Относится к болезням:

- Анестезия
- Болевой синдром

Противопоказания:

Менингит, опухоли, полиомиелит, внутричерепное кровотечение. Остеохондроз, спондилиты, туберкулез или метастатические поражения позвоночника, перниционзная анемия с неврологической симптоматикой, сердечная недостаточность в фазе декомпенсации, массивный плевральный выпот, значительно повышенное внутрибрюшное давление, выраженный асцит, опухоли брюшной полости, выраженная артериальная гипотензия (кардиогенный или гиповолемический шок), септицемия, гнойничковые поражения кожи в месте инъекции, нарушение свертывания крови или терапия антикоагулянтами, в/в регионарная анестезия по Биеру. Повышенная чувствительность к местноанестезирующим средствам амидного типа.

Способ применения и дозы:

Индивидуальный, в зависимости от показаний и применяемой лекарственной формы.

Максимальная разовая доза: 6 мг/кг.

Побочное действие:

Со стороны нервной системы: головная боль, нарушение зрения, диспноэ, апноэ, тремор, подергивание мышц, судороги; редко - нарушение сознания, затуманивание зрения, диплопия, слепота.

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко - снижение АД, тахикардия, брадикардия.

Аллергические реакции: редко - кожная сыпь, зуд, ринит, ангионевротический отек, анафилактический шок.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При применении в акушерстве, особенно при парацервикальной блокаде, возможна брадикардия плода.

Артикаин выделяется с грудным молоком в клинически незначимых количествах, поэтому при необходимости применения у матери в период лактации прерывать грудное вскармливание не требуется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Трициклические антидепрессанты усиливают гипотензивное действие артикаина.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью и по строгим показаниям следует применять при дефиците псевдохолинэстеразы, вегето-сосудистой дистонии, заболеваниях ЦНС, злокачественной анемии, состояниях хронической гипоксии.

Может быть использован в комбинации с эпинефрином, с раствором глюкозы.

Источник: http://drugs.thead.ru/Artikain-Binergiya