

[Артракам](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◇ **Порошок для приготовления раствора для приема внутрь** белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета.

	1 пак.
глюкозамина сульфата натрия хлорид	1.884 г,
в т.ч. глюкозамина сульфат	1.5 г

Вспомогательные вещества: сорбитол - 0.296 г, лимонная кислота - 0.02 г.

2.2 г - пакеты термосвариваемые (20) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Глюкозамина сульфат обладает противовоспалительным и обезболивающим действием, восполняет эндогенный дефицит глюкозамина, стимулирует синтез протеогликанов и гиалуроновой кислоты синовиальной жидкости; увеличивает проницаемость суставной капсулы, восстанавливает ферментативные процессы в клетках синовиальной мембраны и суставного хряща. Способствует фиксации серы в процессе синтеза хондроитинсерной кислоты, тормозит развитие дегенеративных процессов в суставах, восстанавливает их функцию, уменьшая суставные боли.

Фармакокинетика

Всасывание в ЖКТ - 90%, биодоступность - 26%, $T_{1/2}$ - 70 ч.

Показания к применению:

- остеоартроз периферических суставов;
- остеоартроз суставов позвоночника;
- остеохондроз.

Относится к болезням:

- [Остеoarтрит](#)
- [Остеoarтроз](#)
- [Остеохондроз](#)

Противопоказания:

- индивидуальная повышенная чувствительность к глюкозамина сульфату и другим компонентам препарата;
- тяжелая хроническая почечная недостаточность;
- беременность;
- период лактации;
- не рекомендуется назначение препарата в детском возрасте (до 12 лет) из-за отсутствия клинических данных у этой категории пациентов.

С *осторожностью* следует назначать препарат при непереносимости морепродуктов (креветки, моллюски), т.к. возрастает вероятность развития аллергических реакций, а также пациентам с бронхиальной астмой, сахарным диабетом.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь.

Содержимое 1 пакетика растворяют в 200 мл воды, принимают внутрь 1 раз/сут в течение 6 недель.

По назначению врача курс лечения можно повторять с интервалом 2 месяца.

Побочное действие:

Переносимость препарата хорошая, в отдельных случаях возможны: гастралгия, метеоризм, диарея, запор, аллергические реакции - крапивница, зуд.

Передозировка:

Случаи передозировки неизвестны.

Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Совместим с НПВС, парацетамолом и ГКС.

Увеличивает абсорбцию тетрациклинов, уменьшает - полусинтетических пенициллинов, хлорамфеникола.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами

Данные о влиянии на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами отсутствуют.

Условия хранения:

Атракам

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Не использовать по истечении срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Artrakam>