

## [Артравир-Инкамфарм](#)



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### **Форма выпуска, описание и состав**

◇ **Мазь для наружного применения** светло-желтого цвета, с характерным запахом.

	<b>100 г</b>
хондроитина сульфат	5 г

Вспомогательные вещества: диметилсульфоксид - 10 г, ланолин безводный - 15 г, вазелин медицинский - 50 г, вода очищенная - до 100 г.

- 10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
- 15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
- 20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
- 25 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
- 30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
- 50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
- 75 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
- 100 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
- 25 г - банки стеклянные (1) - пачки картонные.
- 50 г - банки стеклянные (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Средство, влияющее на фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, является высокомолекулярным мукополисахаридом. Замедляет резорбцию костной ткани и снижает потери кальция, ускоряет процессы восстановления костной ткани, тормозит процесс дегенерации хрящевой ткани. Препятствует сжатию соединительной ткани и играет роль своеобразной смазки суставных поверхностей. При наружном применении замедляет прогрессирование остеоартроза. Нормализует обмен веществ в гиалиновой ткани. Стимулирует регенерацию суставного хряща.

#### **Фармакокинетика**

При однократном приеме внутрь среднетерапевтической дозы  $C_{max}$  в плазме достигается через 3-4 ч, в синовиальной жидкости - через 4-5 ч. Биодоступность составляет 13%. Выводится почками в течение 24 ч.

### Показания к применению:

Остеопороз, парадонтопатия, переломы (для ускорения образования костной мозоли), дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника.

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к хондроитина сульфату, склонность к кровоточивости, тромбофлебиты, беременность, период лактации (грудное вскармливание).

**Способ применения и дозы:**

Внутрь взрослым - по 1.5-1 г 2 раза/сут.

Наружно - 2 раза/сут в течение 2-3 недель.

**Побочное действие:**

*Редко:* аллергические реакции.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Хондроитина сульфат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

**Особые указания и меры предосторожности:**

Диагнозы

- Анкилозирующий спондилит
- Болезнь Педжета
- Гигантоклеточный артериит
- Остеомиелит

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Artravir-Inkamfarm>