

[Артравир-Инкамфарм \(раствор\)](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Раствор для в/м введения бесцветный или слегка желтоватый, прозрачный.

	1 мл
хондроитина сульфат натрия	100 мг

Вспомогательные вещества: вода д/и - до 1 мл.

1 мл - ампулы стеклянные (5) - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки картонные.

2 мл - ампулы стеклянные (5) - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки картонные.

1 мл - ампулы стеклянные (5) - поддоны пластиковые (1) - пачки картонные.

2 мл - ампулы стеклянные (5) - поддоны пластиковые (1) - пачки картонные.

1 мл - ампулы стеклянные (10) - пачки картонные.

2 мл - ампулы стеклянные (10) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство, влияющее на фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, является высокомолекулярным мукополисахаридом. Замедляет резорбцию костной ткани и снижает потери кальция, ускоряет процессы восстановления костной ткани, тормозит процесс дегенерации хрящевой ткани. Препятствует сжатию соединительной ткани и играет роль своеобразной смазки суставных поверхностей. При наружном применении замедляет прогрессирование остеоартроза. Нормализует обмен веществ в гиалиновой ткани. Стимулирует регенерацию суставного хряща.

Фармакокинетика

При однократном приеме внутрь среднетерапевтической дозы C_{max} в плазме достигается через 3-4 ч, в синовиальной жидкости - через 4-5 ч. Биодоступность составляет 13%. Выводится почками в течение 24 ч.

Показания к применению:

Остеопороз, парадонтопатия, переломы (для ускорения образования костной мозоли), дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к хондроитина сульфату, склонность к кровотечениям, тромбозы, беременность, период лактации (грудное вскармливание).

Способ применения и дозы:

Внутрь взрослым - по 1.5-1 г 2 раза/сут.

Наружно - 2 раза/сут в течение 2-3 недель.

Побочное действие:

Редко: аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Хондроитина сульфат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Анкилозирующий спондилит
- Болезнь Педжета
- Гигантоклеточный артериит
- Остеомиелит

Источник: http://drugs.thead.ru/Artravir-Inkamfarm_rastvor