

Артрофоон



Код АТХ:

- [L03](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки гомеопатические** от белого до белого с кремоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской, с гладкой, однородной поверхностью; на плоской стороне с риской нанесена надпись "MATERIA MEDICA", на другой плоской стороне нанесена надпись "ARTHROFON".

	1 таб.
аффинно очищенные антитела к человеческому фактору некроза опухоли альфа (ФНО _{альфа}) с содержанием активной формы вещества не более 10 ⁻¹⁵ нг/г	3 мг

Вспомогательные вещества: магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая, лактоза.

- 20 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
- 20 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 20 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.
- 50 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.
- 50 шт. - банки полимерные с кольцом первого вскрытия (1) - пачки картонные.
- 75 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.
- 100 шт. - банки полимерные с кольцом первого вскрытия (1) - пачки картонные.
- 100 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.
- 75 шт. - банки полимерные с кольцом первого вскрытия (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Экспериментально и клинически доказано, что препарат модулирует выработку и функциональную активность эндогенного фактора некроза опухоли альфа (ФНО α) при ревматоидном артрите, остеоартрозе, остеохондрозе, боли в спине. Оказывает противовоспалительное и анальгезирующее действие. За счет уменьшения продукции ряда провоспалительных цитокинов, медиаторов воспаления препятствует прогрессированию воспалительного поражения тканей и органов-мишеней при воспалительно-дегенеративных заболеваниях.

Показания к применению:

- ревматоидный артрит;
- остеоартроз (в том числе спондилоартроз) и другие заболевания суставов.

В период ремиссии возможно применение препарата в виде монотерапии, в период обострения - в составе комплексной терапии (с НПВС).

Относится к болезням:

- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Остеоартрит](#)
- [Остеоартроз](#)
- [Спондилоартрит](#)

Противопоказания:

- возраст до 18 лет (ввиду отсутствия опыта клинического применения);
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Внутрь. На 1 прием - 2 таб. (держать во рту до полного растворения - не во время приема пищи). Препарат принимать 2 раза/сут, вечером и утром (до и после сна). Рекомендуемая длительность приема препарата - до 6 мес.

При выраженном болевом синдроме в первые 2-4 недели терапии рекомендован прием препарата до 4 раз/сут в составе комплексной терапии. При улучшении состояния постепенно перейти на прием 2 таб. 2 раза/сут.

Побочное действие:

Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

Передозировка:

При случайной передозировке возможны диспептические явления, обусловленные входящими в состав препарата наполнителями.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Безопасность применения Артрофоона при беременности и в период лактации не изучалась. При необходимости приема препарата следует учитывать соотношение риск/польза.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Случаи несовместимости с другими лекарственными средствами до настоящего времени не зарегистрированы.

Возможно сочетание препарата с НПВС.

Особые указания и меры предосторожности:

На 3-5 сутки после начала лечения возможно умеренно выраженное преходящее усиление болевого синдрома или местных проявлений воспаления, не требующее изменений в режиме фармакотерапии. В отдельных случаях при выраженном усилении болевого синдрома или местных признаков воспаления необходимо временно уменьшить дозу до 1-2 таб./сут.

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: возраст до 18 лет (ввиду отсутствия опыта клинического применения).

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света, в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Artrofoon>