

## Артрокер



### **Код АТХ:**

- [M01AX21](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Диацереин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

Капсулы 50 мг в блистерах или стрипах по 10 шт.; в пачке картонной 1, 3 или 10 блистеров или стрипов.

### **Состав:**

#### **Одна капсула содержит:**

*Активное вещество:* диацереин 50 мг

*Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат 188 мг, повидон 5 мг, кроскармеллоза натрия 4 мг, натрия лаурилсульфат 1 мг, магния стеарат 0,5 мг, кремния диоксид коллоидный 0,5 мг

*Твердая желатиновая капсула (корпус):* желатин 12,3959 мг, вода 2,175 мг, краситель бриллиантовый голубой 0,1035 мг, титана диоксид 0,1463 мг, краситель флоксин В 0,0173 мг, метилпарагидроксибензоат 0,12 мг, пропилпарагидроксибензоат 0,03 мг, натрия лаурилсульфат 0,012 мг

*Твердая желатиновая капсула (крышечка):* желатин 20,0085 мг, вода 3,48 мг, краситель бриллиантовый голубой 0,0045 мг, титана диоксид 0,234 мг, краситель хинолиновый желтый 0,009 мг, краситель флоксин В 0,0048 мг, метилпарагидроксибензоат 0,192 мг, пропилпарагидроксибензоат 0,048 мг, натрия лаурилсульфат 0,192 мг.

### **Описание:**

Твердые желатиновые капсулы №2, с надписью «Micro/Micro», состоящие из серого корпуса и синей крышечки.

---

Содержимое капсулы: желтый гранулированный порошок.

## Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Диацереин ингибирует синтез и активность ИЛ-1, играющего важную роль в развитии воспаления, дегенерации и последующем разрушении хряща при остеоартрозе. Диацереин также замедляет образование металлопротеиназ (коллагеназ), которые участвуют в процессе повреждения хрящевой ткани. При длительном применении диацереин стимулирует синтез протеогликанов и не влияет на синтез ПГ.

### Фармакокинетика

После приема внутрь диацереин быстро абсорбируется из ЖКТ и полностью деацетилируется до реина. Одновременный прием препарата с пищей увеличивает биодоступность на 25%. Стах реина в плазме достигается через 144 мин. T<sub>1/2</sub> из плазмы составляет 255 мин. Связь реина с альбумином практически 100%. При однократном приеме 50 мг Стах достигает 3,15 мг/л. При многократном приеме препарата Стах повышается в связи с кумуляцией препарата. Реин выводится почками в неизменном виде (20%) и в виде глюкуронида (60%) и сульфата (20%). Реин проникает через плацентарный барьер и ГЭБ.

## Показания к применению:

Первичный и вторичный остеоартроз.

## Относится к болезням:

- [Остеoarтрит](#)

## Противопоказания:

Препарат не должен применяться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже:

- индивидуальная непереносимость компонентов препарата или высокая чувствительность к антрахиноновым препаратам (например слабительные средства);
- тяжелая печеночная или почечная недостаточность;
- кишечная непроходимость;
- воспалительные заболевания кишечника;
- непереносимость лактозы;
- дефицит лактазы;
- глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- беременность;
- период лактации;
- детский возраст (до 18 лет).

*С осторожностью:* пациенты с раздражением нижних отделов кишечника — только в особых случаях.

## Способ применения и дозы:

Внутрь, после еды (целиком, не разжевывая, запивая водой).

## Артрокер

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Стандартная дозировка — по 1 капс. 2 раза в день (утром и вечером). Эффект от лечения следует ожидать через 2–4 нед. Артрокер применяется непрерывно, длительно или курсами продолжительностью не менее 4 мес. Длительность перерыва между курсами лечения устанавливает врач.

### Побочное действие:

При повышенной чувствительности к компонентам препарата могут отмечаться аллергические реакции различной степени, сыпь, зуд.

*Со стороны пищеварительной системы:* в начальном периоде приема препарата временно могут иметь место диарея, тошнота, рвота, боль в животе. В этом случае доза должна быть снижена до 1 капс. в день.

Может появляться интенсивное окрашивание мочи, от желтого до коричневого цвета (в зависимости от pH), что не требует снижения дозы (отмены) препарата.

### Передозировка:

*Симптомы:* возможна диарея, слабость. В случае передозировки или случайного приема лекарства детьми необходимо обратиться к врачу.

*Лечение:* симптоматическое.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат Артрокер не рекомендован к применению во время беременности и лактации.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Артрокер не рекомендуется принимать вместе с препаратами или продуктами, оказывающими влияние на консистенцию содержимого кишечника (например большое количество клетчатки).

Антациды уменьшают абсорбцию препарата.

При одновременном приеме с антибиотиками или химиотерапевтическими препаратами, влияющими на микрофлору кишечника, может повыситься частота нежелательных явлений со стороны кишечника.

### Особые указания и меры предосторожности:

Продолжительность лечения (в зависимости от достигнутого результата) может быть длительной.

В период, предшествующий развитию терапевтического эффекта, Артрокер можно принимать одновременно с ненаркотическими анальгетиками и другими НПВС. Необходим периодический контроль показателей крови, активности печеночных ферментов, мочи. При ухудшении функции почек врач должен принять решение о снижении дозы препарата или его отмене.

Продолжительность лечения (в зависимости от достигнутого результата) может быть длительной.

В период, предшествующий развитию терапевтического эффекта, Артрокер можно принимать одновременно с ненаркотическими анальгетиками и другими НПВС.

Препарат не оказывает влияния на вождение автотранспорта и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.

### Срок годности:

## **Артрокер**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Artroker>