

## Артрозилен (аэрозоль)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

## Артрозилен (аэрозоль)



### Код АТХ:

- [M02AA10](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Кетопрофен](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Аэрозоль для наружного применения 15%** в виде белой однородной пены; после выхода газа - прозрачная жидкость бледно-желтого цвета.

	<b>1 г</b>
кетопрофена лизиновая соль	150 мг

*Вспомогательные вещества:* полисорбат 80, полипропиленгликоль, поливинилпирролидон (повидон), лаванда неролен, бензиловый спирт, вода очищенная, смесь пропана и бутана.

Баллоны алюминиевые емкостью 25 мл (1) с насадкой-распылителем - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

НПВС. Оказывает местное противовоспалительное, анальгезирующее и антиэкссудативное действие.

## Артрозилен (аэрозоль)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

При наружном применении Артрозилен в виде спрея уменьшает проявления воспаления и болевые ощущения в области пораженных суставов, сухожилий, связок, мышц. При суставном синдроме вызывает ослабление болей в суставах в покое и при движении, уменьшение утренней скованности и припухлости суставов.

Кетопрофена лизиновая соль не оказывает катаболического влияния на суставной хрящ.

### Фармакокинетика

При наружной аппликации всасывается медленно; доза 50-150 мг через 5-8 ч создает уровень концентрации в плазме 0.08-0.15 мкг/мл. Биодоступность препарата - около 5%.

Препарат практически не кумулирует в организме.

### Показания к применению:

- заболевания опорно-двигательного аппарата (в т.ч. ревматоидный артрит, псориатический артрит, анкилозирующий спондилоартрит, остеоартроз периферических суставов и позвоночника, ревматические поражения мягких тканей);
- мышечные боли ревматического и неревматического происхождения;
- травматические повреждения мягких тканей.

### Относится к болезням:

- [Анкилозирующий спондилоартрит](#)
- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Остеоартрит](#)
- [Остеоартроз](#)
- [Псориаз](#)
- [Ревматизм](#)
- [Спондилоартрит](#)
- [Травмы](#)

### Противопоказания:

- "аспириновая" астма;
- мокнущие дерматозы;
- экзема;
- нарушение целостности кожных покровов;
- III триместр беременности;
- период лактации;
- детский возраст до 6 лет;
- повышенная чувствительность к кетопрофену или другим компонентам препарата, ацетилсалициловой кислоте или другим НПВС.

С *осторожностью* следует назначать препарат при обострении печеночной порфирии, эрозивно-язвенных поражениях ЖКТ, тяжелых нарушениях функции печени и почек, хронической сердечной недостаточности, бронхиальной астме, в I и II триместрах беременности, а также детям в возрасте до 12 лет и пациентам пожилого возраста.

### Способ применения и дозы:

Применяется наружно. Разовая доза составляет 1-2 г (объем грецкого ореха).

Препарат следует наносить 2-3 раза/сут, осторожно втирая до полного впитывания. При ионофорезе препарат наносится на отрицательный полюс.

## **Артрозилен (аэрозоль)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Продолжительность лечения не должна превышать 10 дней (без консультации врача).

### **Побочное действие:**

*Дерматологические реакции:* кожные проявления аллергических реакций, фотосенсибилизация.

### **Передозировка:**

В настоящее время случаев передозировки препарата Артрозилен не зарегистрировано.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение препарата Артрозилен в III триместре беременности противопоказано. В I и II триместрах беременности применять препарат Артрозилен следует с осторожностью и под контролем врача.

Опыта применения Артрозилен в период лактации не имеется.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Данных о лекарственном взаимодействии препарата Артрозилен аэрозоль не имеется.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Препарат следует наносить только на неповрежденную кожу. Следует избегать попадания в глаза и на слизистую оболочку. Во избежание проявлений повышенной чувствительности и фоточувствительности, рекомендуется избегать воздействия на кожу солнечных лучей в течение курса лечения.

#### ***При нарушениях функции почек***

С *осторожностью* следует назначать препарат при тяжелых нарушениях функции почек.

#### ***При нарушениях функции печени***

С *осторожностью* следует назначать препарат при тяжелых нарушениях функции печени.

#### ***Применение в пожилом возрасте***

С *осторожностью* следует назначать препарат пациентам пожилого возраста.

#### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан в детском возрасте до 6 лет.

С *осторожностью* следует назначать препарат детям в возрасте от 6 до 12 лет.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Баллон с аэрозолем нельзя перегревать! Срок годности – 2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Artrozilen\\_aerozol](http://drugs.thead.ru/Artrozilen_aerozol)