Артрозилен (аэрозоль)



Код АТХ:

- M02AA10

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Кетопрофен

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Аэрозоль для наружного применения 15%*** в виде белой однородной пены; после выхода газа - прозрачная жидкость бледно-желтого цвета.

	1 г
кетопрофена лизиновая соль	150 мг

Вспомогательные вещества: полисорбат 80, полипропиленгликоль, поливинилпирролидон (повидон), лаванда неролен, бензиловый спирт, вода очищенная, смесь пропана и бутана.

Баллоны алюминиевые емкостью 25 мл (1) с насадкой-распылителем - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

НПВС. Оказывает местное противовоспалительное, анальгезирующее и антиэкссудативное действие.

При наружном применении Артрозилен в виде спрея уменьшает проявления воспаления и болевые ощущения в области пораженных суставов, сухожилий, связок, мышц. При суставном синдроме вызывает ослабление болей в суставах в покое и при движении, уменьшение утренней скованности и припухлости суставов.

Кетопрофена лизиновая соль не оказывает катаболического влияния на суставной хрящ.

Фармакокинетика

При накожной аппликации всасывается медленно; доза 50-150 мг через 5-8 ч создает уровень концентрации в плазме 0.08-0.15 мкг/мл. Биодоступность препарата - около 5%.

Препарат практически не кумулирует в организме.

Показания к применению:

— заболевания опорно-двигательного аппарата (в т.ч. ревматоидный артрит, псориатический артрит, анкилозирующий спондилоартрит, остеоартроз периферических суставов и позвоночника, ревматические поражения мягких тканей);

— мышечные боли ревматического и неревматического происхождения;

— травматические повреждения мягких тканей.

Относится к болезням:

- Анкилозирующий спондилоартрит
- Артрит
- Артроз
- Остеоартрит
- Остеоартроз
- Псориаз
- Ревматизм
- Спондилоартрит
- Травмы

Противопоказания:

— "аспириновая" астма;

— мокнущие дерматозы;

— экзема;

— нарушение целостности кожных покровов;

— III триместр беременности;

— период лактации;

— детский возраст до 6 лет;

— повышенная чувствительность к кетопрофену или другим компонентам препарата, ацетилсалициловой кислоте или другим НПВС.

С *осторожностью* следует назначать препарат при обострении печеночной порфирии, эрозивно-язвенных поражениях ЖКТ, тяжелых нарушениях функции печени и почек, хронической сердечной недостаточности, бронхиальной астме, в I и II триместрах беременности, а также детям в возрасте до 12 лет и пациентам пожилого возраста.

Способ применения и дозы:

Применяется наружно. Разовая доза составляет 1-2 г (объем грецкого ореха).

Препарат следует наносить 2-3 раза/сут, осторожно втирая до полного впитывания. При ионофорезе препарат наносится на отрицательный полюс.

Продолжительность лечения не должна превышать 10 дней (без консультации врача).

Побочное действие:

Дерматологические реакции: кожные проявления аллергических реакций, фотосенсибилизация.

Передозировка:

В настоящее время случаев передозировки препарата Артрозилен не зарегистрировано.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата Артрозилен в III триместре беременности противопоказано. В I и II триместрах беременности применять препарат Артрозилен следует с осторожностью и под контролем врача.

Опыта применения Артрозилена в период лактации не имеется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данных о лекарственном взаимодействии препарата Артрозилен аэрозоль не имеется.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат следует наносить только на неповрежденную кожу. Следует избегать попадания в глаза и на слизистую оболочку. Во избежание проявлений повышенной чувствительности и фоточувствительности, рекомендуется избегать воздействия на кожу солнечных лучей в течение курса лечения.

При нарушениях функции почек

С *осторожностью* следует назначать препарат при тяжелых нарушениях функции почек.

При нарушениях функции печени

С *осторожностью* следует назначать препарат при тяжелых нарушениях функции печени.

Применение в пожилом возрасте

С *осторожностью* следует назначать препарат пациентам пожилого возраста.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 6 лет.

С *осторожностью* следует назначать препарат детям в возрасте от 6 до 12 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Баллон с аэрозолем нельзя перегревать! Срок годности – 2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Artrozilen_aerozol