

## Артрозилен (гель)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

## Артрозилен (гель)



### Код АТХ:

- [M02AA10](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Кетопрофен](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Гель для наружного применения 5%** прозрачный, густой, с запахом лаванды.

	<b>1 г</b>
кетопрофена лизиновая соль	50 мг

*Вспомогательные вещества:* карбоксиполиметилен, триэтаноламин, полисорбат, этанол 95%, метилпарагидроксibenзоат, лаванда неролен, вода.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

НПВС. Оказывает местное противовоспалительное, анальгезирующее и антиэкссудативное действие.

## Артрозилен (гель)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

При наружном применении Артрозилен уменьшает проявления воспаления и болевые ощущения в области пораженных суставов, сухожилий, связок, мышц. При суставном синдроме вызывает ослабление болей в суставах в покое и при движении, уменьшение утренней скованности и припухлости суставов.

Кетопрофена лизиновая соль не оказывает катаболического влияния на суставной хрящ

### Фармакокинетика

При наружной аппликации всасывается медленно; доза 50-150 мг через 5-8 ч создает уровень концентрации в плазме 0.08-0.15 мкг/мл. Биодоступность препарата - около 5%.

Препарат практически не кумулирует в организме.

### Показания к применению:

- острые и хронические воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата (в т.ч. ревматоидный артрит, псориатический артрит, анкилозирующий спондилоартрит, остеоартроз периферических суставов и позвоночника, ревматические поражения мягких тканей);
- мышечные боли ревматического и неревматического происхождения;
- травматические повреждения мягких тканей.

### Относится к болезням:

- [Анкилозирующий спондилоартрит](#)
- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Остеоартрит](#)
- [Остеоартроз](#)
- [Псориаз](#)
- [Ревматизм](#)
- [Спондилоартрит](#)
- [Травмы](#)

### Противопоказания:

- "аспириновая" астма;
- мокнущие дерматозы;
- экзема;
- нарушение целостности кожных покровов;
- III триместр беременности;
- период лактации;
- детский возраст до 6 лет;
- повышенная чувствительность к кетопрофену или другим компонентам препарата, ацетилсалициловой кислоте или другим НПВС.

С *осторожностью* следует назначать препарат при обострении печеночной порфирии, эрозивно-язвенных поражениях ЖКТ, тяжелых нарушениях функции печени и почек, хронической сердечной недостаточности, бронхиальной астме, в I и II триместрах беременности, а также детям в возрасте до 12 лет и пациентам пожилого возраста.

### Способ применения и дозы:

Разовая доза геля составляет 3-5 г (объем крупной вишни). Препарат следует наносить 2-3 раза/сут, осторожно втирая до полного впитывания. Продолжительность лечения не должна превышать 10 дней (без консультации врача).

## **Побочное действие:**

*Дерматологические реакции:* кожные проявления аллергических реакций, фотосенсибилизация. При длительном применении на обширных поверхностях кожи возможно развитие системных побочных эффектов.

## **Передозировка:**

В настоящее время о случаях передозировки препаратом Артрозилен не сообщалось.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение препарата Артрозилен в III триместре беременности противопоказано. В I и II триместрах беременности применять препарат Артрозилен следует с осторожностью и под контролем врача. При необходимости применения препарата в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Данных о лекарственном взаимодействии препарата Артрозилен гель не имеется.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Препарат следует наносить только на неповрежденную кожу. Следует избегать попадания в глаза и на слизистую оболочку. Во избежание проявлений повышенной чувствительности и фоточувствительности, рекомендуется избегать воздействия на кожу солнечных лучей в течение курса лечения.

Гель для наружного применения могут быть использованы при физиотерапевтическом лечении (ионофорезе, мезотерапии): при ионофорезе препарат наносят на отрицательный полюс.

### ***При нарушениях функции почек***

При **нарушении функции почек** необходимо снижение дозы.

### ***При нарушениях функции печени***

При **нарушении функции печени** необходимо снижение дозы.

### ***Применение в пожилом возрасте***

**Пациентам пожилого возраста** не следует назначать более 2 суппозиторий в сутки.

**Пациентам пожилого возраста** следует назначать не более 1 амп./сут.

### ***Применение в детском возрасте***

Для системного применения препарат противопоказан в **детском и подростковом возрасте до 18 лет**.

Для наружного применения препарат противопоказан **детям в возрасте до 6 лет**.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре до 25°C. Срок годности - 3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Artrozilen\\_gel](http://drugs.thead.ru/Artrozilen_gel)