

Асинис



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Капли гомеопатические** в виде прозрачной жидкости с желтоватым оттенком, со специфическим запахом.

	100 мл
хрен русский (Armoracia) D1	10 мл
желтокорень канадский (Hydrastis) D6	10 мл
ртути сульфид красный (Cinnabaris) D12	10 мл
кальция сульфат (Calcium sulfuricum) D12	10 мл
калия бихромат (Kalium bichromicum) D6	10 мл

Вспомогательные вещества: этанол 43% по весу.

20 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

50 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

100 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комплексный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.

Оказывает противовоспалительное, противомикробное, иммуностимулирующее и дезинтоксикационное действие, уменьшает повышенную секрецию в пазухах носа, облегчает носовое дыхание.

Фармакокинетика

Действие препарата Асинис является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии заболеваний полости и придаточных пазух носа, в т.ч.:

— гайморита;

— фронтита;

— хронического ринита.

Относится к болезням:

- [Ринит](#)
- [Фронтит](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и подросткам старше 12 лет препарат назначают по 10 капель 3 раза/сут. Курс лечения - 2-4 недели. При необходимости курс лечения можно повторить через 1 месяц после консультации с врачом.

В случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможен прием каждые 0.5-1 ч, до наступления улучшения (но не более 8 раз), после чего принимать 3 раза/сут.

Принимают внутрь в чистом виде или после разведения в 1 ст. ложке воды за 30 мин до или через 1 ч после еды, подержав 20-30 сек во рту перед проглатыванием.

Побочное действие:

Редко: повышенное слюноотделение.

Пациент должен быть информирован о том, что при возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Вопрос о применении препарата Асинис при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) решается врачом индивидуально.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимое взаимодействие препарата Асинис с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Поскольку препарат Асинис содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение раствора или ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Применение в детском возрасте

Нет данных о применении препарата у детей в возрасте до 12 лет.

Условия хранения:

Асинис

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и сильных электромагнитных полей месте, недоступном для детей. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Asinis>