Аскорутин-Убф



Код АТХ:

- C05CA51

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Аскорбиновая кислота
- Рутозид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики
- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Восстанавливает дефицит витамина С и Р. Рутин вместе с аскорбиновой кислотой участвует в окислительно-восстановительных процессах, обладает антиоксидантными свойствами, предотвращает окисление и способствует депонированию аскорбиновой кислоты в тканях. Оба компонента укрепляют сосудистую стенку (способствуют образованию межклеточного вещества и снижают активность гиалуронидазы), уменьшают проницаемость и ломкость капилляров.

Показания к применению:

Профилактика и лечение:

— гипо- и авитаминоза Р и С;

— поражений капилляров, связанных с применением непрямых антикоагулянтов и салицилатов.

Комплексная терапия заболеваний, сопровождающихся нарушением проницаемости сосудов:

— геморрагический диатез;

— кровоизлияния в сетчатку глаза;

— капилляротоксикоз;

— лучевая болезнь;

— септический эндокардит;

— ревматизм;

— гломерулонефрит;

— арахноидит;

— аллергические заболевания;

— корь;

— скарлатина;

— сыпной тиф;

— тромбоцитопеническая пурпура.

Относится к болезням:

- Аллергия
- Геморрой
- Диатез
- Корь
- Ревматизм
- Скарлатина
- Тромбоз
- Эндокардит

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

С *осторожностью*: состояния, сопровождающиеся гиперкоагуляцией крови и склонностью к тромбозам, тромбофлебит.

Способ применения и дозы:

Применяют внутрь, по 1 таб. 2-3 раза/сут. Продолжительность лечения - 3-4 нед (длительность зависит от характера заболевания и эффективности лечения).

Побочное действие:

Аллергические реакции, диспепсические расстройства, головная боль.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Аскорбиновая кислота повышает всасывание лекарственных средств группы пенициллина, железа; снижает клинический эффект гепарина и непрямых антикоагулянтов.

Источник: http://drugs.thead.ru/Askorutin-Ubf