# Аснитон



## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

***Таблетки*** белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрические, с фаской.

| | **1 таб.** |
|---|---|
| бетагистина дигидрохлорид | 8 мг |

*Вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая, маннит, лимонная кислота безводная, тальк, аэросил (кремния диоксид коллоидный).

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
30 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

***Таблетки*** белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрические, с фаской и риской.

| | **1 таб.** |
|---|---|
| бетагистина дигидрохлорид | 16 мг |

*Вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая, маннит, лимонная кислота безводная, тальк, аэросил (кремния диоксид коллоидный).

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
30 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Синтетический аналог гистамина. Бетагистин действует главным образом на гистаминовые $H_1$- и $H_3$-рецепторы внутреннего уха и вестибулярных ядер ЦНС. Путем прямого агонистического воздействия на $H_1$-рецепторы сосудов внутреннего уха, а также опосредованно через воздействие на $H_3$-рецепторы улучшает микроциркуляцию и проницаемость капилляров, нормализует давление эндолимфы в лабиринте и улитке. Вместе с тем бетагистин увеличивает кровоток в базиллярной артерии.

Обладает выраженным центральным эффектом, являясь ингибитором $H_3$-рецепторов ядер вестибулярного нерва. Улучшает проводимость в нейронах вестибулярных ядер на уровне ствола головного мозга.

Клиническим проявлением указанных свойств является снижение частоты и интенсивности головокружения, уменьшение шума в ушах, улучшение слуха в случае его понижения.

***Фармакокинетика***

*Всасывание и распределение*

После приема внутрь быстро абсорбируется из ЖКТ. С

$T_{max}$ в плазме крови достигается через 3 ч. Связывание с белками плазмы низкое.

*Выведение*

$T_{1/2}$ - 3-4 ч. Практически полностью выводится почками в виде метаболита (2-пиридилуксусной кислоты) в течение 24 ч.

## Показания к применению:

— лечение и профилактика вестибулярного головокружения различного происхождения;

— синдромы, включающие головокружение и головную боль, шум в ушах, прогрессирующее снижение слуха, тошноту и рвоту;

— болезнь или синдром Меньера.

## Относится к болезням:

- Головокружение
- Тошнота
- Шум в ушах

## Противопоказания:

— детский и подростковый возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных);

— беременность;

— период лактации;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* назначать при язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки (в т.ч. в анамнезе), феохромоцитома, бронхиальная астма. Указанных больных следует регулярно наблюдать в период лечения.

## Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь, во время еды.

Таблетки 8 мг: 1-2 таб. 3 раза/сут.

Таблетки 16 мг: 1/2-1 таб. 3 раза/сут.

Улучшение обычно отмечается уже в начале терапии, стабильный терапевтический эффект наступает после 2 недель лечения и может нарастать в течение нескольких месяцев лечения. Лечение длительное. Длительность приема препарата подбирается индивидуально.

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* желудочно-кишечные нарушения.

*Аллергические реакции:* кожный зуд, сыпь, крапивница, отек Квинке.

## Передозировка:

*Симптомы*: тошнота, рвота, судороги.

*Лечение:* промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Недостаточно данных для оценки безопасности и эффективности применения препарата при беременности и в период лактации. В связи с этим Аснитон противопоказан при беременности. При необходимости применения препарата в период лактации грудное вскармливание на время лечения следует прекратить.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами неизвестны.

## Особые указания и меры предосторожности:

В период лечения следует регулярно контролировать состояние пациентов с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки (в т.ч. в анамнезе), феохромоцитомой, бронхиальной астмой.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Бетагистин не обладает седативным эффектом и не влияет на способность управлять автомобилем или заниматься видами деятельности, требующими быстроты психомоторных реакций.

***Применение в детском возрасте***

Препарат противопоказан детям и подросткам до 18 лет в связи с недостаточностью данных.

## Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Asniton