

## [Атаракс \(раствор\)](#)



### **Код АТХ:**

- [N05BB01](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Гидроксизин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Нейротропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Анксиолитическое и седативное средство, блокатор гистаминовых H<sub>1</sub>-рецепторов, производное пиперазина. Обладает умеренной м-холиноблокирующей активностью. Оказывает противорвотное действие.

#### **Фармакокинетика**

Обладает высокой абсорбцией. С<sub>max</sub> после перорального приема достигается через 2 ч; T<sub>1/2</sub> у взрослых составляет 12-20 ч, у детей - 7 ч. Метаболиты обнаруживаются в грудном молоке.

### **Показания к применению:**

Неврозы и невротические состояния, проявляющиеся повышенной возбудимостью, чувством эмоционального напряжения, беспокойством; органические поражения ЦНС, сопровождающиеся повышенной возбудимостью; абстинентный синдром при хроническом алкоголизме; премедикация перед хирургическими операциями, предупреждение и купирование рвоты в послеоперационном периоде; кожный зуд.

### **Относится к болезням:**

- [Абстинентный синдром](#)
- [Зуд](#)
- [Неврит](#)

- [Неврозы](#)

## **Противопоказания:**

Порфирия, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, закрытоугольная глаукома, период родов, беременность, лактация, повышенная чувствительность к гидроксизину, период родовой деятельности.

## **Способ применения и дозы:**

Для приема внутрь разовая доза для взрослых варьирует от 25 мг до 100 мг; частота приема, в зависимости от показаний, составляет 1-4 раза/сут.

Для быстрого достижения терапевтического эффекта раствор гидроксизина вводят глубоко в/м в дозе 50-100 мг; далее можно вводить с интервалом 4-6 ч.

## **Побочное действие:**

*Со стороны ЦНС и периферической нервной системы:* сонливость, повышенная утомляемость, тремор, судороги, головная боль, головокружение, атаксия, слабость.

*Со стороны органа зрения:* острая глаукома, нарушение аккомодации.

*Со стороны мочевыделительной системы:* острая задержка мочи.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* тахикардия, снижение АД.

*Со стороны пищеварительной системы:* сухость во рту, запор, повышение активности трансаминаз.

*Прочие:* бронхоспазм, аллергические реакции, повышенная потливость.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Гидроксизин противопоказан к применению при беременности, в период родов. Лактация (грудное вскармливание) является противопоказанием к применению.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении гидроксизин усиливает эффекты, анальгетиков, анксиолитиков, барбитуратов, этанола.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

С осторожностью применять у пациентов с почечной недостаточностью, миастенией, затруднении мочеиспускания, запорах, деменции, склонности к судорожным припадкам, аритмии или приеме антиаритмических препаратов, печеночной недостаточностью.

При п/к введении гидроксизина возможно повреждение тканей, при в/в введении - гемолиз.

При необходимости проведения аллергологических тестов, прием гидроксизина необходимо прекратить за 5 дней до исследования.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

В период терапии необходимо воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстрых психомоторных реакций.

### **При нарушениях функции почек**

С осторожностью применять у пациентов с почечной недостаточностью.

### **При нарушениях функции печени**

## **Атаракс (раствор)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

С осторожностью применять у пациентов с печеночной недостаточностью.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Ataraks\\_rastvor](http://drugs.thead.ru/Ataraks_rastvor)