

## Атероклефит



### Код АТХ:

- [C10AX](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

### Форма выпуска:

◇ **Экстракт для приема внутрь (жидкий)** от светло- до темно-коричневого цвета со специфическим запахом; при хранении допускается появление осадка.

	<b>1 мл</b>
трава клевера	0.5 г

*Вспомогательные вещества:* этанол 40% до 1 мл.

30 мл - бутылки (1) - пачки картонные.  
50 мл - бутылки (1) - пачки картонные.  
100 мл - бутылки (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Атероклефит представляет собой жидкий экстракт из травы клевера красного, полученный путем двойной экстракции сырья 40 % этанолом. Согласно результатам проведенных доклинических исследований, жидкий экстракт травы клевера красного обладает умеренным гиполипидемическим действием: способствует снижению концентрации общего холестерина, концентрации липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и повышению концентрации липопротеидов высокой плотности (ЛПВП).

Механизм действия жидкого экстракта травы клевера красного связан с перераспределением холестерина из ЛПНП в ЛПВП, в составе которых холестерин быстрее метаболизируется и выводится из организма. Жидкий экстракт травы клевера красного также способствует снижению интенсивности перекисного окисления липидов; в результате чего уменьшается перекисная модификация липопротеидов и нормализуется проницаемость сосудистой стенки.

#### **Фармакокинетика**

Данные отсутствуют.

## **Показания к применению:**

— гиперлипидемия IIa типа по Фредериксону, слабовыраженная.

## **Противопоказания:**

- возраст до 18 лет;
- черепно-мозговая травма;
- заболевания головного мозга;
- заболевания печени;
- выраженные нарушения функции почек;
- алкоголизм;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

*С осторожностью:* нарушения функции почек легкой и средней степени тяжести.

Лицам имеющим хронические заболевания, перед применением препарата обязательно проконсультироваться с врачом.

## **Способ применения и дозы:**

Внутрь: по 1 чайной ложке препарата, предварительно разведенного в 1/3 стакана воды, 3 раза в день за 30 минут до приема пищи. Курс лечения 3-6 месяцев.

Проведение повторного курса лечения возможно по рекомендации врача. Перед назначением препарата, пациент должен быть переведен на гиполипидемическую диету, которую должен соблюдать в течение всего периода терапии.

## **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции (кожный зуд, сыпь), а также тошнота, головная боль, ощущение горечи во рту.

## **Передозировка:**

При применении препарата в дозах, значительно превышающих рекомендуемые, возможно появление симптомов алкогольной интоксикации. Лечение симптоматическое.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания. При необходимости назначения препарата в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

В настоящее время нет данных о взаимодействии препарата Атероклефит при совместном применении его с другими лекарственными препаратами, в частности, с гиполипидемическими препаратами.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

## **Атероклефит**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Содержание этанола в препарате составляет не менее 35%. Разовая доза препарата (1 чайная ложка) содержит 1,58 г абсолютного спирта, максимальная суточная доза (3 чайные ложки) содержит 4,74 г абсолютного спирта.

В период терапии препаратом Атероклефит необходим контроль активности «печеночных» трансаминаз, креатинфосфокиназы, контроль функции почек.

Женщины детородного возраста при применении препарата должны использовать надежные методы контрацепции.

Не следует превышать указанную суточную дозу.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

В период лечения препаратом Атероклефит необходимо воздержаться от управления транспортными средствами и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **При нарушениях функции почек**

С осторожностью при нарушениях функции почек легкой и средней степени тяжести.

### **При нарушениях функции печени**

Противопоказано при заболеваниях печени.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказано детям до 18 лет.

## **Условия хранения:**

При температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Ateroklefit>