Атероклефит



Код АТХ:

- C10AX

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru

Форма выпуска:

◊ ***Экстракт для приема внутрь (жидкий)*** от светло- до темно-коричневого цвета со специфическим запахом; при хранении допускается появление осадка.

	1 мл
трава клевера	0.5 г

Вспомогательные вещества: этанол 40% до 1 мл.

30 мл - бутылки (1) - пачки картонные.
50 мл - бутылки (1) - пачки картонные.
100 мл - бутылки (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Атероклефит представляет собой жидкий экстракт из травы клевера красного, полученный путем двойной экстракции сырья 40 % этанолом. Согласно результатам проведенных доклинических исследований, жидкий экстракт травы клевера красного обладает умеренным гиполипидемическим действием: способствует снижению концентрации общего холестерина, концентрации липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и повышению концентрации липопротеидов высокой плотности (ЛПВП).

Механизм действия жидкого экстракта травы клевера красного связан с перераспределением холестерина из ЛПНП в ЛПВП, в составе которых холестерин быстрее метаболизируется и выводится из организма. Жидкий экстракт травы клевера красного также способствует снижению интенсивности перекисного окисления липидов; в результате чего уменьшается перекисная модификация липопротеидов и нормализуется проницаемость сосудистой стенки.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению:

— гиперлипидемия IIa типа по Фредериксону, слабовыраженная.

Противопоказания:

— возраст до 18 лет;

— черепно-мозговая травма;

— заболевания головного мозга;

— заболевания печени;

— выраженные нарушения функции почек;

— алкоголизм;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: нарушения функции почек легкой и средней степени тяжести.

Лицам имеющим хронические заболевания, перед применением препарата обязательно проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы:

Внутрь: по 1 чайной ложке препарата, предварительно разведенного в 1/3 стакана воды, 3 раза в день за 30 минут до приема пищи. Курс лечения 3-6 месяцев.

Проведение повторного курса лечения возможно по рекомендации врача. Перед назначением препарата, пациент должен быть переведен на тпохолестеринемическую диету, которую должен соблюдать в течение всего периода терапии.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции (кожный зуд, сыпь), а также тошнота, головная боль, ощущение горечи во рту.

Передозировка:

При применении препарата в дозах, значительно превышающих рекомендуемые, возможно появление симптомов алкогольной интоксикации. Лечение симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания. При необходимости назначения препарата в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В настоящее время нет данных о взаимодействии препарата Атероклефит при совместном применении его с другими лекарственными препаратами, в частности, с гиполипидемическими препаратами.

Особые указания и меры предосторожности:

Содержание этанола.в препарате составляет не менее 35%. Разовая доза препарата (1 чайная ложка) содержит 1,58 г абсолютного спирта, максимальная суточная доза (3 чайные ложки) содержит 4,74 г абсолютного спирта.

В период терапии препаратом Атероклефит необходим контроль активности «печеночных» трансаминаз, креатинфосфокиназы, контроль функции почек.

Женщины детородного возраста при применении препарата должны использовать надежные методы контрацепции.

Не следует превышать указанную суточную дозу.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения препаратом Атероклефит необходимо воздержаться от управления транспортными средствами и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При нарушениях функции почек

С осторожностью при нарушениях функции почек легкой и средней степени тяжести.

При нарушениях функции печени

Противопоказано при заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 18 лет.

Условия хранения:

При температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ateroklefit