Атрикан 250



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Тенонитрозол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капсулы кишечнорастворимые мягкие, от желтого до желто-коричневого цвета, овальные; содержимое капсул - маслянистая однородная масса серо-коричневого цвета, со слабым характерным запахом.

	1 капс.
тенонитрозол	250 мг

Вспомогательные вещества: масло арахиса - 194 мг, масло соевых бобов гидрогенизированное - 6 мг, лецитин соевый - 5 мг.

Состав оболочки капсул: желатин - 134 мг, сорбитола и сорбитанов раствор - 66 мг, титана диоксид (Е171) - 1.5 мг, краситель железа оксид желтый (Е172) - 1 мг, глицерол - 3.5 мг, гипромеллозы фталат - 30 мг, дибутилфталат - 5.2 мг.

8 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противопротозойное препарат. Активен в отношении трихомонад.

Оказывает также антиалкогольное (дисульфирамоподобное) действие.

Фармакокинетика

Хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте. Медленно выводится, что позволяет поддерживать в крови трихомонацидную концентрацию в течение многих часов.

Показания к применению:

— трихомониаз мочеполовой системы.

Относится к болезням:

- Трихомониаз

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к тенонитрозолу и другим компонентам препарата;

— острая и хроническая печеночная недостаточность;

— детский возраст.

Способ применения и дозы:

Для приема внутрь.

По одной капсуле 2 раза в день (утром и вечером) во время еды в течение 4 дней. Не рекомендуется превышать указанную суточную дозу.

В случае пропуска в приеме одной или нескольких доз возобновите прием препарата в обычной дозе.

Побочное действие:

Со стороны ЖКТ: иногда - тошнота, чувство тяжести в эпигастрии, потеря аппетита.

Аллергические реакции: крапивница, кожные высыпания, зуд.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка:

Нет данных.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата в период беременности возможно в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Препарат выделяется с грудным молоком, поэтому при необходимости назначения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Несовместим с лекарственными препаратами, содержащими этанол.

Особые указания и меры предосторожности:

Во время лечения избегать употребления алкоголя и лекарственных средств, содержащих этанол. Имеется определенный риск у больных злоупотребляющих алкоголем, особенно при превышении рекомендуемой дозировки. Нельзя назначать препарат лицам, не способным воздержаться от приема алкоголя на время лечения.

Необходимо проведение одновременного лечения половых партнеров.

Не носить контактные линзы во время лечения (возможно проникновение препарата в глазную жидкость).

Возможно, окрашивание склер и мочи в желтый цвет.

В случае изменения количества лейкоцитов крови на фоне приема других лекарственных препаратов, обратитесь к врачу.

Препарат используют для лечения трихомониаза только у взрослых. Во время курса лечения трихомониаза следует избегать половых контактов.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при острой и хронической печеночной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 30°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Atrikan_250