Аурисан



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капли ушные 0.05%.

	1 мл
декаметоксин (декаметилендиметилментоксикарбонилметиламмония дихлорид)	500 мкг

5 мл - флаконы (1) в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат Аурисан обладает антисептическим действием и имеет широкий спектр антимикробного действия в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (род Streptococcus, род Staphylococcus, сем. Enterobacteriaceae, Corynebacterium diphtheriae), дрожжеподобных грибов рода Candida, дерматомицетов (род Trichophyton, род Epidermophyton), простейших и вирусов. На микроорганизмы препарат действует бактерицидно, спороцидно, фунгицидно. Аурисан повышает чувствительность бактерий к антибиотикам, потенцирует действие традиционных
антимикробных средств при комплексном лечении.

Фармакокинетика

Не изучена.

Показания к применению:

— для лечения бактериальных и грибковых острых и хронических наружных и средних отитов.

Относится к болезням:

- Отит

Противопоказания:

— нарушение целостности барабанной перепонки;

— детский возраст до 12 лет;

— индивидуальная непереносимость.

Способ применения и дозы:

Местно. При отитах пациенту в слуховой проход закладывается турунда из ваты или марли, затем на турунду закапывается раствор (согретый до температуры тела) ежедневно по 2-3 капли Аурисана 3-4 раза в день.

Курс лечения 7 дней. После вскрытия флакон закрывают крышкой-капельницей.

Побочное действие:

Возможны местные *аллергические реакции:* гиперемия, зуд и шелушение кожи наружного слухового прохода, которые исчезают без лечения, после отмены препарата.

Возможно скоропреходящее ощущение жжения при применении препарата, а также реакция местного раздражения уха при повышенной индивидуальной чувствительности к декаметилендиметилментоксикарбонилметил аммония дихлориду (декаметоксину).

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не описаны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

При необходимости применения в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В настоящее время информация о взаимодействии препарата Аурисан с другими лекарственными средствами отсутствует.

Особые указания и меры предосторожности:

Аурисан применяется исключительно при заболеваниях уха. При тяжелых, и стойких инфекциях местное лечение необходимо дополнить системным применением антибиотиков.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами, а также на выполнение других работ, которые требуют повышенной концентрации внимания и скорости реакции.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

Список Б. Хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Aurisan