

[Ауробин](#)



Код АТХ:

- [D07XA02](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Мазь для ректального и наружного применения белого или почти белого цвета, гомогенная, практически без запаха.

	1 г
преднизолона капронат	2 мг
лидокаина гидрохлорид	20 мг
D-пантенол	20 мг

Вспомогательные вещества: полисорбат 60, триклозан, метилпарагидроксibenзоат, цетиловый спирт, глицерол, пропиленгликоль, макрогола стеарат, парафин жидкий, диметикон, масло нейтральное, стеариновая кислота, вода очищенная.

20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гормоны и их антагонисты](#)
- [Нейротропные средства](#)
- [Регенеранты и репаратанты](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для лечения воспалительных заболеваний аногенитальной области.

Преднизолон капронат является негалогенизированным глюкокортикостероидом. Оказывает местное противоаллергическое и противовоспалительное действие. Препарат снижает проницаемость сосудов, повышает тонус стенок сосудов, уменьшает симптомы воспаления.

Лидокаин - местный анестетик, быстро устраняет боль и чувство жжения.

Декспантенол - способствует регенерации пораженного эпителия и слизистой оболочки.

Триклозан - является антисептическим средством широкого спектра действия, который действует на бактерии и грибки.

Фармакокинетика

Фармакокинетика не изучалась.

Показания к применению:

- процессы, сопровождающиеся воспалением перианальной области;
- зуд заднего прохода, экзема и дерматит перианальной области;
- анальные трещины, геморроидальные узлы;
- свищ заднего прохода.

Относится к болезням:

- [Анальные трещины](#)
- [Воспаление](#)
- [Геморрой](#)
- [Зуд](#)
- [Экзема](#)

Противопоказания:

- бактериальные, вирусные и грибковые инфекции кожи;
- одновременное применение лидокаина по другим показаниям;
- детский возраст до 1 года;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Препарат нельзя применять для лечения глаз или периорбитальной области.

Способ применения и дозы:

Наружно, ректально.

Взрослые, пожилые больные:

мазь наносят на пораженную поверхность 2-4 раза/сут.

При внутренних геморроидальных узлах небольшое количество мази (величиной с горошину) вводится в прямую кишку 2-4 раза/сут. При уменьшении симптомов препарат можно применять реже. Курс лечения 5-7 дней.

Дети в возрасте старше 1 года:

при использовании препарата у детей следует избегать длительного его применения и на обширной поверхности независимо от возраста.

Побочное действие:

Применение местных глюкокортикостероидов может вызывать, в первую очередь, местные побочные эффекты: ухудшение заживления ран, чувство жжения, раздражение, сухость, истончение кожи, повышенную чувствительность кожи.

При длительном применении глюкокортикостероидов - атрофия кожи, местный гирсутизм, телеангиэктазии, пурпура, гипопигментация, гипертрихоз, фолликулиты, угреподобные высыпания, развитие грибковой инфекции, аллергический контактный дерматит, опрелость.

При нанесении на большие поверхности - системные проявления побочных действий глюкокортикостероида (задержка роста, синдром Иценко-Кушинга, доброкачественное повышение внутричерепного давления после окончания лечения, гипергликемия, глюкозурия, гипокалиемия, повышение артериального давления).

При длительном применении и на большой поверхности вследствие системного действия лидокаина возможно возникновение брадикардии.

Передозировка:

Острая передозировка маловероятна, однако, в случае хронической передозировки или при неправильном применении препарата могут возникнуть симптомы за счет системного действия глюкокортикостероида, а также брадикардия при избыточном введении препарата в прямую кишку (за счет лидокаина). При этом необходимо прекратить лечение или постепенно уменьшить дозу.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о безопасности и эффективности применения препарата при беременности отсутствуют, поэтому в I триместре беременности не рекомендуется назначать Ауробин. Во II и III триместрах беременности при необходимости применения препарата следует соотнести предполагаемую пользу для матери и потенциальный риск для плода.

Период грудного вскармливания: кортикостероиды и лидокаин проникают в материнское молоко, поэтому при необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При местном применении препарата лекарственные взаимодействия не описаны.

Особые указания и меры предосторожности:

Необходимо по возможности избегать длительной терапии, особенно у детей, из-за возможного подавления функции надпочечников. Препарат у детей можно применять с осторожностью, в минимальной дозе, обеспечивающей достижение терапевтического эффекта. Продолжительность терапии у детей не должна превышать 5 дней.

Следует избегать случайного попадания препарата в глаза или на периорбитальную область. При попадании следует промыть водой.

Развитие или распространение вторичной инфекции требует отмены препарата и назначение противомикробной или противогрибковой терапии. Влажные условия способствуют развитию бактериальной инфекции, поэтому кожа должна очищаться перед каждым нанесением мази.

Нанесение на обширную поверхность или использование длительное время может привести к системному всасыванию активных компонентов. При длительном применении препарата в одной области может развиваться атрофия кожи, особенно у молодых лиц.

Влияние препарата на способность управлять автомобилем и рабочими механизмами:

нет данных о влиянии Ауробина на способность к вождению автотранспорта или на работу в условиях повышенного внимания.

При нарушениях функции почек

Данные о применении препарата у больных с нарушением функции почек не предоставлены.

При нарушениях функции печени

Ауробин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Данные о применении препарата у больных с нарушением функции печени не предоставлены.

Применение в пожилом возрасте

Режим дозирования у пациентов пожилого возраста не отличается от такого у взрослых.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан к применению у детей в возрасте до 1 года. Препарат у детей можно применять с осторожностью, в минимальной дозе, обеспечивающей достижение терапевтического эффекта. Продолжительность терапии у детей не должна превышать 5 дней.

Условия хранения:

Условия хранения:

Список Б. Хранить при температуре от 8 до 15 °С в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Aurobin>