Айстил



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Натрия гиалуронат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капли глазные***	**100 мл**
натрия гиалуронат	150 мг

0.3 мл - тюбик-капельницы (5) - стрипы (4) в запаянных пакетах - пачки картонные.
10 мл - флакон-капельницы (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Натрия гиалуронат является полисахаридом природного происхождения, характеризуется высокой молекулярной массой. Такие свойства как высокая вязкость и высокая способность связывать воду позволяют полимеру стабилизировать слезную пленку и увеличивать ее гидратирующие свойства.

Фармакокинетика

Абсорбции натрия гиалуроната при закапывании в глаз не происходит. При введении в переднюю камеру период его полувыведения составляет 10.5 ч.

Показания к применению:

— симптоматическое лечение синдрома «сухого глаза».

Противопоказания:

— детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности);

— индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Местно. Закапывать по 1 капле до 6 раз в день в конъюнктивальную полость глаза. Капли, расфасованные в тюбики-капельницы по 0.3 мл, следует использовать немедленно после вскрытия. Тюбики-капельницы выбрасывают сразу после использования.

Побочное действие:

Аллергические реакции (такие как покраснение, жжение или раздражение век или конъюнктивы глаза), слезотечение, возникновение поверхностного кератита. Побочные эффекты проходят после прекращения приема препарата.

Передозировка:

Сведения о передозировке препарата отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение при беременности и в период грудного вскармливания, так как при местном применении препарата его абсорбции не происходит.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Следует избегать совместного применения препарата с другими дезинфицирующими и увлажняющими глаз лекарственными средствами.

Натрия гиалуронат может образовывать осадок в присутствии солей четвертичного аммония. Совместного применения растворов, содержащих эти вещества, следует избегать.

Особые указания и меры предосторожности:

Перед применением препарата следует снять контактные линзы и снова установить их не ранее, чем через 20-30 минут.

Применение в детском возрасте

Противопокзан детям до 18 лет.

Условия хранения:

При температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Aystil