

[Айстил](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Натрия гиалуронат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ Капли глазные	100 мл
натрия гиалуронат	150 мг

0.3 мл - тубик-капельницы (5) - стрипы (4) в запаянных пакетах - пачки картонные.
10 мл - флакон-капельницы (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Натрия гиалуронат является полисахаридом природного происхождения, характеризуется высокой молекулярной массой. Такие свойства как высокая вязкость и высокая способность связывать воду позволяют полимеру стабилизировать слезную пленку и увеличивать ее гидратирующие свойства.

Фармакокинетика

Абсорбции натрия гиалуроната при закапывании в глаз не происходит. При введении в переднюю камеру период его полувыведения составляет 10.5 ч.

Показания к применению:

— симптоматическое лечение синдрома «сухого глаза».

Противопоказания:

- детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности);
- индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Местно. Закапывать по 1 капле до 6 раз в день в конъюнктивальную полость глаза. Капли, расфасованные в тьюбики-капельницы по 0.3 мл, следует использовать немедленно после вскрытия. Тьюбики-капельницы выбрасывают сразу после использования.

Побочное действие:

Аллергические реакции (такие как покраснение, жжение или раздражение век или конъюнктивы глаза), слезотечение, возникновение поверхностного кератита. Побочные эффекты проходят после прекращения приема препарата.

Передозировка:

Сведения о передозировке препарата отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение при беременности и в период грудного вскармливания, так как при местном применении препарата его абсорбции не происходит.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Следует избегать совместного применения препарата с другими дезинфицирующими и увлажняющими глаз лекарственными средствами.

Натрия гиалуронат может образовывать осадок в присутствии солей четвертичного аммония. Совместного применения растворов, содержащих эти вещества, следует избегать.

Особые указания и меры предосторожности:

Перед применением препарата следует снять контактные линзы и снова установить их не ранее, чем через 20-30 минут.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

При температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Aystil>