# **Азулан**



## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com<sup>англ</sup>

# Форма выпуска:

#### Форма выпуска, описание и состав

**Раствор для приема внутрь, местного и наружного применения** в виде жидкости от коричневого с зеленоватым оттенком до темно-коричневого с красноватым оттенком цвета, с характерным запахом; при хранении допускается появление осадка.

	100 г
экстракт ромашки аптечной жидкий (44 : 100)* с	95.881 г
содержанием суммы флавоноидов в пересчете на рутин	
0.25%	
гвайазулен в пересчете на 100% вещество	0.037 г

Вспомогательные вещества: твин-80 (полисорбат 80) - 4.082 г.

\* Ромашки экстракт жидкий (44: 100) получают из цветков ромашки аптечной (ромашки ободранной) - Chamomilla recutita (L.) Rausch. (Matricaria recutita L., M. chamomilla L.), семейство астровые - Asteraceae; экстрагент - спирт этиловый 50 %, аммиака раствор 10 % до pH (8.0-8.5), соотношение сырье: конечный экстракт - 44: 100.

50 мл - флаконы (1) - пачки картонные. 100 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

# Фармакологические свойства:

# Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Оказывает противовоспалительное, спазмолитическое и ветрогонное действие, обладает умеренными противомикробными свойствами.

## Показания к применению:

Внутрь - в комплексной терапии гастрита, дуоденита, колита, метеоризма; местно - при воспалительных заболеваниях слизистых оболочек полости рта (стоматит, гингивит, пародонтит), вагинитах; наружно - при воспалительных заболеваниях кожи (в т.ч. трещины, укусы насекомых).

# Относится к болезням:

- Вагинит
- Гастрит
- <u>Гингивит</u>
- Дуоденит
- Колит
- Метеоризм
- Пародонтит
- Стоматит

# Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и растениям семейства астровых; при приеме внутрь - беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

С осторожностью: бронхиальная астма, атопический дерматит в анамнезе; при приеме внутрь - заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

# Способ применения и дозы:

Внутрь. При желудочно-кишечных заболеваниях **взрослым и детям с 12 лет** в разведенном виде - по 2.5 мл на стакан (200 мл) теплой воды 2-3 раза/сут. Курс лечения - 2-3 недели. Проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Наружно при воспалительных заболеваниях кожи (повязки, промывания, компрессы) и местно при воспалительных заболеваниях слизистых оболочек (в виде микроклизм по 50-100 мл, полосканий, влагалищных спринцеваний) препарат применяют в разведенном виде - 7.5 мл на 1 л воды.

# Побочное действие:

*Возможно:* аллергические реакции (контактный дерматит, аллергический конъюнктивит, бронхоспазм, отек Квинке, анафилактический шок).

## Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период лактации противопоказано применение препарата внутрь.

#### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В связи с ингибирующим действием экстракта ромашки на микросомальные ферменты печени не рекомендуется одновременное применение препарата с антикоагулянтами (варфарин) в связи с повышением риска развития кровотечения.

#### Особые указания и меры предосторожности:

Перед применением препарата пациенту необходимо проконсультироваться с врачом.

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 14 дней пациенту следует сообщить об этом лечащему врачу.

Содержание этанола в препарате составляет не менее 32%. При приеме препарата внутрь в максимальной разовой дозе содержание этанола составляет около 0.63 г, в максимальной суточной дозе - около 1.89 г.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения при приеме препарата внутрь следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Источник: http://drugs.thead.ru/Azulan