Б-190



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки	1 таб.
Б-190	150 мг

6 шт. - упаковки ячейковые контурные.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные.

48 шт. - упаковки ячейковые контурные.

Фармакотерапевтическая группа:

• Вегетотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

5-190 относится к a_1 -адреномиметикам прямого действия. Оказывает радиозащитный эффект и имеет большую широту терапевтического действия.

Прием препарата практически здоровым человеком, как в покое, так и в условиях умеренной физической нагрузки, вызывает ряд характерных эффектов, основными из которых являются: пиломоторная реакция (гусиная кожа); парестезии в области лица, волосистой части головы и верхней половины туловища; замедление частоты сердечных сокращений; повышение систолического и диастолического АД. Препарат обладает сосудосуживающим действием, повышает кровонаполнение селезенки и почек.

Указанные фармакодинамические эффекты в покое выражены больше, чем при нагрузке; они возникают в первые минуты после введения, достигают максимума к 5–30 мин и исчезают в большинстве случаев через час-полтора после применения препарата.

Б-190, обладая спазмолитической активностью, угнетает перистальтику и уменьшает тонус кишечника, препятствует развитию диареи, не обладает гипергликемическими свойствами, не оказывает бронхолитического действия.

Фармакокинетика

Биодоступность составляет около 30%. C_{max} в крови достигается через 1-2 ч после перорального применения. Почками выводится более половины введенного препарата. За сутки выводится более 90% от введенного препарата.

Показания к применению:

— в качестве профилактического радиозащитного средства у практически здоровых людей в чрезвычайных условиях и аварийных ситуациях при прогнозировании доз облучения, вызывающих развитие острой лучевой болезни.

Противопоказания:

- артериальная гипертония;
- расстройства сердечного ритма и проводимости;
- ИБС;
- тиреотоксикоз;
- сахарный диабет;
- органические изменения в ЦНС.

Способ применения и дозы:

Препарат в измельченном виде применяют внутрь в дозе $0.45 \, \Gamma$ (3 таб.), за $15-20 \, \text{мин}$ до предполагаемого облучения. Допускается повторный прием препарата с интервалом $1 \, \text{ч}$.

Побочное действие:

При применении препарата возможно повышение АД, урежение пульса до 38-40 ударов/мин, а также AV-диссоциация и AV-блокада. При появлении одного из симптомов прием препарата следует прекратить и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Совместим с препаратами, применяемыми для купирования первичной реакции на облучение.

Обладая сосудосуживающим действием, препарат Б-190 оказывает влияние на всасываемость лекарств. Он в несколько раз удлиняет анестезию, вызванную новокаином, но не влияет на интенсивность и продолжительность снотворного действия гексенала.

Условия хранения:

Список Б. Препарат хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Источник: http://drugs.thead.ru/B-190