БАКТАВИТ



Код АТХ:

- S01AX16

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Пиклоксидин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Капли глазные*** в виде прозрачного, бесцветного или слегка желтоватого раствора.

	1 мл
пиклоксидина дигидрохлорид*	0.5 мг,
что соответствует содержанию пиклоксидина	0.434 мг

* допускается 5% избыток пиклоксидина дигидрохлорида при производстве препарата.

Вспомогательные вещества: декстроза (глюкоза) безводная - 50 мг, полисорбат 80 - 0.25 мг, вода очищенная - до 1 мл.

10 мл - флаконы-капельницы полимерные вместимостью 10 мл (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства
- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептическое средство для применения в офтальмологии, производное бигуанидов. Пиклоксидин активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных бактерий, хламидий, некоторых вирусов и грибов.

Показания к применению:

Инфекционный конъюнктивит и кератоконъюнктивит, включая инфекцию, вызванную хламидиями.

Относится к болезням:

- Инфекции
- Кератит
- Кератоконус
- Конъюнктивит

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к пиклоксидину.

Способ применения и дозы:

Пиклоксидин применяют местно 2-6 раз/сут. Длительность лечения не более 10 дней.

Побочное действие:

Возможно: местное раздражение, реакции повышенной чувствительности.

Особые указания и меры предосторожности:

Если наряду с пиклоксидином используются другие лекарственные препараты в глазных каплях, необходимо, чтобы интервал между закапыванием составлял не менее 15 минут.

Источник: http://drugs.thead.ru/BAKTAVIT