

БАКТАВИТ



Код АТХ:

- [S01AX16](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Пиклоксидин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◇ **Капли глазные** в виде прозрачного, бесцветного или слегка желтоватого раствора.

	1 мл
пиклоксидина дигидрохлорид*	0.5 мг,
что соответствует содержанию пиклоксидина	0.434 мг

* допускается 5% избыток пиклоксидина дигидрохлорида при производстве препарата.

Вспомогательные вещества: декстроза (глюкоза) безводная - 50 мг, полисорбат 80 - 0.25 мг, вода очищенная - до 1 мл.

10 мл - флаконы-капельницы полимерные вместимостью 10 мл (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептическое средство для применения в офтальмологии, производное бигуанидов. Пиклоксидин активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных бактерий, хламидий, некоторых вирусов и грибов.

Показания к применению:

Инфекционный конъюнктивит и кератоконъюнктивит, включая инфекцию, вызванную хламидиями.

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)
- [Кератит](#)
- [Кератоконус](#)
- [Конъюнктивит](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к пиклоксидину.

Способ применения и дозы:

Пиклоксидин применяют местно 2-6 раз/сут. Длительность лечения не более 10 дней.

Побочное действие:

Возможно: местное раздражение, реакции повышенной чувствительности.

Особые указания и меры предосторожности:

Если наряду с пиклоксидином используются другие лекарственные препараты в глазных каплях, необходимо, чтобы интервал между закапыванием составлял не менее 15 минут.

Источник: <http://drugs.thead.ru/BAKTAVIT>