

[Бактериофаг Дизентерийный Поливалентный \(раствор\)](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор для приема внутрь и ректального введения	1 фл.
бактериофаг дизентерийный	20 мл
20 мл - флаконы стеклянные (4) - пачки картонные.	
20 мл - флаконы стеклянные (10) - пачки картонные.	
Раствор для приема внутрь и ректального введения	1 фл.
бактериофаг дизентерийный	100 мл
100 мл - флаконы стеклянные (1) - пачки картонные.	

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат вызывает специфический лизис бактерий возбудителей бактериальной дизентерии.

Показания к применению:

— лечение и профилактика бактериальной дизентерии, вызванной *Shigella flexneri* сероваров 1, 2, 3, 4, 6 и *Shigella sonnei*.

Важным условием эффективной фаготерапии является предварительное определение фагочувствительности возбудителя.

Относится к болезням:

- [Дизентерия](#)

Противопоказания:

— гиперчувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Бактериофаг Дизентерийный Поливалентный (раствор)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Препарат предназначен для приема внутрь и ректального введения. Для лечения препарат принимают внутрь 3 раза в день натощак за 1 ч до приема пищи с первого дня заболевания в течение 7-10 дней.

Рекомендуемые дозировки препарата

Возраст	Доза на 1 прием (мл)	
	перорально	ректально
0-6 мес	5	10
6-12 мес	10-15	20
от 1 года до 3 лет	15-20	20-30
от 3 до 8 лет	20-30	30-40
от 8 лет и старше	30-40	50-60

При дизентерии, характеризующейся слабовыраженным колитическим синдромом, и в период реконвалесценции рекомендуется сочетание двукратного приема внутрь с однократным ректальным введением разовой возрастной дозы препарата в виде клизмы после опорожнения кишечника.

В профилактических целях препарат рекомендуется применять во время групповых заболеваний в организованных коллективах и семьях. Оптимальная схема использования - ежедневный прием разовой возрастной дозы. Продолжительность приема препарата определяется условиями эпидситуации.

Побочное действие:

Не установлено.

Передозировка:

Не установлена.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение данного медицинского препарата при беременности и в период кормления грудью возможно при наличии инфекций, вызванных фагочувствительными штаммами бактерий (по рекомендации врача).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение препарата возможно в сочетании с другими лекарственными средствами, в том числе с антибиотиками.

Особые указания и меры предосторожности:

При помутнении препарат не применять!

Вследствие содержания в препарате питательной среды, в которой могут развиваться бактерии из окружающей среды, вызывая помутнение препарата, необходимо при вскрытии флакона соблюдать следующие правила:

- тщательно мыть руки;
- обработать колпачок спиртосодержащим раствором;
- снять колпачок, не открывая пробки;
- не класть пробку внутренней поверхностью на стол или другие предметы;
- не оставлять флакон открытым;
- вскрытый флакон хранить только в холодильнике.

Бактериофаг Дизентерийный Поливалентный (раствор)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

При использовании малых доз (2-8 капель) препарат необходимо отбирать стерильным шприцем в объеме 0,5-1мл.

Препарат из вскрытого флакона при соблюдении условий хранения, вышеперечисленных правил и отсутствии помутнения может быть использован в течение всего срока годности.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Отсутствуют.

Применение в детском возрасте

Применяется по показаниям.

Условия хранения:

Препарат хранят в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 в недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8°C.

Условия транспортировки

В соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8°C. Допускается транспортирование при температуре от 9 до 25°C не более 1 месяца.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bakteriofag_Dizenteriyyny_Polivalentnyy_rastvor