

Бактериофаг Сальмонеллезный Групп Abcde



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com^{англ}](#)

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ **Таблетки** круглой формы, диаметром 7 мм, двояковыпуклые, с гладкой поверхностью, светло-серого цвета различной интенсивности, со светлыми включениями.

	1 таб.
бактериофаг сальмонеллезный групп А, В, С, D, E (лиофилизированный концентрат фильтрата фаголизата наиболее распространенных сальмонелл: гр. А - <i>Salmonella paratyphi A</i> ; гр. В - <i>S. paratyphi B</i> , <i>S. typhimurium</i> , <i>S. heidelberg</i> ; гр. С - <i>S. newport</i> , <i>S. choleraesuis</i> , <i>S. oranienburg</i> , <i>S. infantis</i> ; гр. D - <i>S. dublin</i> , <i>S. enteritidis</i> ; гр. Е - <i>S. anatum</i> , <i>S. newlands</i>)	72 мг

Вспомогательные вещества: пектин 5 мг, кальция глюконат моногидрат 16 мг, декстрозы моногидрат 3 мг, тальк очищенный 3 мг, кальция стеарат 1 мг.

50 шт. - флаконы (10) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат вызывает специфический лизис сальмонелл группы А - *Salmonella paratyphi A*; группы В - *Salmonella paratyphi B*, *Salmonella typhimurium*, *Salmonella heidelberg*; группы С - *Salmonella newport*, *Salmonella choleraesuis*, *Salmonella oranienburg*, *Salmonella infantis*; группы D - *Salmonella dublin*, *Salmonella enteritidis*; группы Е - *Salmonella anatum*, *Salmonella newlands*.

Показания к применению:

— лечение и профилактика заболеваний и бактерионосительства, вызванных сальмонеллами.

Относится к болезням:

- [Сальмонеллез](#)

Противопоказания:

— возраст до 1 года.

Способ применения и дозы:

Лечение и профилактика сальмонеллезов у взрослых и детей с одного года. Важным условием эффективной фаготерапии является предварительное определение фагочувствительности возбудителя и раннее применение препарата.

Для лечения препарат принимают 3 раза в день за 1 ч до приема пищи с первого дня заболевания в течение 7 - 10 дней. При заболевании, характеризующемся слабо выраженным колитическим синдромом, и в период реконвалесценции одновременно с приемом таблеток внутрь рекомендуется вводить ректально жидкий бактериофаг, в виде клизма после опорожнения кишечника вместо 1 приема через рот (см. Инструкцию по применению Бактериофага сальмонеллезного групп ABCDE раствора для приема внутрь и местного применения).

Рекомендуемые дозировки препарата

Возраст	Доза на 1 прием
От 1 года до 3 лет	1 таблетка
С 3 до 8 лет	1-2 таблетки
От 8 лет и старше	2-3 таблетки

В профилактических целях препарат рекомендуется применять для предупреждения бактерионосительства, внутрибольничной инфекции, во время групповых заболеваний в организованных коллективах и семьях.

Оптимальные схемы использования - ежедневный прием разовой возрастной дозы. Продолжительность приема препарата определяется условиями эпидситуации.

Побочное действие:

Отсутствует.

Передозировка:

Не установлена.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Целесообразно применение препарата при наличии инфекций, вызванных фагочувствительными штаммами (по рекомендации врача).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение возможно в сочетании с другими лекарственными средствами, в том числе с антибиотиками.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не установлено.

Условия хранения:

Препарат хранят в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 2° до 8 °C.

Срок годности:

2 года.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bakteriofag_Salmonelleznyy_Grupp_Abcde_0