

## [Бактериофаг Сальмонеллезный Групп А,b,c,d,e Жидкий](#)



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Раствор для приема внутрь и местного применения</b> | <b>1 фл.</b> |
| бактериофаг сальмонеллезный групп А, В, С, D, Е жидкий | 100 мл       |
| 100 мл - флаконы (1) - пачки картонные.                |              |
| <b>Раствор для приема внутрь и местного применения</b> | <b>1 фл.</b> |
| бактериофаг сальмонеллезный групп А, В, С, D, Е жидкий | 20 мл        |
| 20 мл - флаконы (4) - пачки картонные.                 |              |
| 20 мл - флаконы (10) - пачки картонные.                |              |

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Препарат вызывает специфический лизис сальмонелл указанных выше серотипов.

### Показания к применению:

— заболевания или бактерионосительство, вызванные сальмонеллами указанных выше серотипов.

Важным условием эффективной фаготерапии является предварительное определение фагочувствительности и раннее применение препарата.

### Относится к болезням:

- [Сальмонеллез](#)

### Противопоказания:

Отсутствуют.

### Способ применения и дозы:

Препарат предназначен для внутреннего применения. Для лечения бактериофаг принимают 3 раза в день через рот за 1 час до приема пищи с первого дня заболевания в течение 7-10 суток. При заболевании, характеризующемся слабовыраженным колитическим синдромом, и в период реконвалесценции одновременно с пероральным применением рекомендуется вводить препарат ректально, в виде клизм, вместо 1 приема через рот.

Рекомендуемые дозировки препарата

| Возраст                | Способ введения                |           |
|------------------------|--------------------------------|-----------|
|                        | Через рот (доза на один прием) | Ректально |
| До 6 месяцев           | 5 мл                           | 10 мл     |
| От 6 месяцев до 1 года | 10- 15мл                       | 20 мл     |
| От 1 года до 3-х лет   | 15-20 мл                       | 20-30 мл  |
| С 3-х лет до 8 лет     | 20-30 мл                       | 30-40 мл  |
| От 8 лет и старше      | 30-40 мл                       | 50-60 мл  |

В профилактических целях препарат рекомендуется применять для предупреждения бактерионосительства, внутрибольничной инфекции, во время групповых заболеваний в организованных коллективах и семьях. Оптимальные схемы использования - ежедневный прием разовой дозы в зависимости от возраста. Продолжительность приема препарата определяется условиями эпидситуации.

## Побочное действие:

Не установлены.

## Передозировка:

Не установлены.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение препарата возможно в сочетании с другими лекарственными средствами, в том числе с антибиотиками.

## Особые указания и меры предосторожности:

Перед употреблением флакон с жидким бактериофагом необходимо взбалтывать. При помутнении не употреблять!

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Применение препарата не влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

### **Применение в детском возрасте**

Возможно применение у детей по показаниям.

## Условия хранения:

Хранение в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8°C в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Bakteriofag\\_Salmonelleznyy\\_Grupp\\_Abcde\\_Zhidkiy](http://drugs.thead.ru/Bakteriofag_Salmonelleznyy_Grupp_Abcde_Zhidkiy)