Бактериофаг Сальмонеллезный Групп A,b,c,d,e Жидкий

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Раствор для приема внутрь и местного применения	**1 фл.**
бактериофаг сальмонеллезный групп A, B, C, D, E жидкий	100 мл

100 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

Раствор для приема внутрь и местного применения	**1 фл.**
бактериофаг сальмонеллезный групп A, B, C, D, E жидкий	20 мл

20 мл - флаконы (4) - пачки картонные.
20 мл - флаконы (10) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат вызывает специфический лизис сальмонелл указанных выше серотипов.

Показания к применению:

— заболевания или бактерионосительство, вызванные сальмонеллами указанных выше серотипов.

Важным условием эффективной фаготерапии является предварительное определение фагочувствительности и раннее применение препарата.

Относится к болезням:

- Сальмонеллез

Противопоказания:

Отсутствуют.

Способ применения и дозы:

Препарат предназначен для внутреннего применения. Для лечения бактериофаг принимают 3 раза в день через рот за 1час до приема пищи с первого дня заболевания в течение 7-10 суток. При заболевании, характеризующемся слабовыраженным колитическим синдромом, и в период реконвалесценции одновременно с пероральным применением рекомендуется вводить препарат ректально, в виде клизм, вместо 1 приема через рот.

Рекомендуемые дозировки препарата

Возраст	Способ введения	
	Через рот (доза на один прием)	Ректально
До 6 месяцев	5 мл	10 мл
От 6 месяцев до 1 года	10- 15мл	20 мл
От 1 года до 3-х лет	15-20 мл	20-30 мл
С 3-х лет до 8 лет	20-30 мл	30-40 мл
От 8 лет и старше	30-40 мл	50-60 мл

В профилактических целях препарат рекомендуется применять для предупреждения бактерионосительства, внутрибольничной инфекции, во время групповых заболеваний в организованных коллективах и семьях. Оптимальные схемы использования - ежедневный прием разовой дозы в зависимости от возраста. Продолжительность приема препарата определяется условиями эпидситуации.

Побочное действие:

Не установлены.

Передозировка:

Не установлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение препарата возможно в сочетании с другими лекарственными средствами, в том числе с антибиотиками.

Особые указания и меры предосторожности:

Перед употреблением флакон с жидким бактериофагом необходимо взбалтывать. При помутнении не употреблять!

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Применение препарата не влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение в детском возрасте

Возможно применение у детей по показаниям.

Условия хранения:

Хранение в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8°С в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bakteriofag_Salmonelleznyy_Grupp_Abcde_Zhidkiy