

Бактиспорин



Код АТХ:

- [A07FA](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бациллюс субтилис](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Иммунотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Лиофилизированная микробная масса живого антагонистически активного штамма *Bacillus subtilis* 3Н, селективированного по признаку хромосомной устойчивости к антибиотику - римфапицину из производственного штамма *B.subtilis* 534. Одна доза препарата содержит не менее 1 млрд и не более 5 млрд живых бактерий.

Обладает антагонистической активностью, подавляя рост патогенных и условно патогенных бактерий, грибов. За счет выделения штаммом *B.subtilis* 3Н ферментов препарат способствует расщеплению белков, жиров, углеводов и клетчатки, улучшая переваривание и усвоение пищи, способствуя очищению ран, воспалительных очагов от некротизированных тканей.

Показания к применению:

- острые кишечные инфекции у детей;
- дисбактериоз кишечника различного генеза;
- бактериальный вагиноз;
- профилактика гнойно-септических осложнений в послеоперационном периоде.

Относится к болезням:

- [Вагинит](#)
- [Дисбактериоз](#)
- [Дисбактериоз кишечника](#)
- [Инфекции](#)

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Острые кишечные инфекции: **детям в возрасте от 1 мес до 1 года** - по 0.5 дозы 2 раза/сут в течение 5-7 сут, **детям в возрасте старше 1 года** - по 1 дозе 2 раза/сут в течение 5-7 сут.

Дисбактериоз кишечника и аллергодерматоз: **детям в возрасте от 1 мес до 1 года** - по 0.5 дозы 2 раза/сут в течение 10-14 сут, **детям старше 1 года** - по 1 дозе 2 раза/сут в течение 10-14 сут, **взрослым** - по 1 дозе 2 раза/сут в течение 1-20 сут.

Бактериальный вагиноз и профилактика гнойно-септических осложнений в послеоперационном периоде: **взрослым** - по 1 дозе 2 раза/сут в течение 5-10 дней.

Побочное действие:

Не описаны.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Применение возможно согласно режиму дозирования.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Baktisporin>