Бактиспорин



Код АТХ:

- A07FA

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бациллюс субтилис

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Иммунотропные средства
- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Лиофилизированная микробная масса живого антагонистически активного штамма Bacillus subtilis 3H, селектированного по признаку хромосомной устойчивости к антибиотику - римфапицину из производственного штамма B.subtilis 534. Одна доза препарата содержит не менее 1 млрд и не более 5 млрд живых бактерий.

Обладает антагонистической активностью, подавляя рост патогенных и условно патогенных бактерий, грибов. За счет выделения штаммом B.subtilis 3H ферментов препарат способствует расщеплению белков, жиров, углеводов и клетчатки, улучшая переваривание и усвоение пищи, способствуя очищению ран, воспалительных очагов от некротизированных тканей.

Показания к применению:

— острые кишечные инфекции у детей;

— дисбактериоз кишечника различного генеза;

— бактериальный вагиноз;

— профилактика гнойно-септических осложнений в послеоперационном периоде.

Относится к болезням:

- Вагинит
- Дисбактериоз
- Дисбактериоз кишечника
- Инфекции

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Острые кишечные инфекции: **детям в возрасте от 1 мес до 1 года** - по 0.5 дозы 2 раза/сут в течение 5-7 сут, **детям в возрасте старше 1 года** - по 1 дозе 2 раза/сут в течение 5-7 сут.

Дисбактериоз кишечника и аллергодерматоз: **детям в возрасте от 1 мес до 1 года** - по 0.5 дозы 2 раза/сут в течение 10-14 сут, **детям старше 1 года** - по 1 дозе 2 раза/сут в течение 10-14 сут, **взрослым** - по 1 дозе 2 раза/сут в течение 1-20 сут.

Бактериальный вагиноз и профилактика гнойно-септических осложнений в послеоперационном периоде: **взрослым** - по 1 дозе 2 раза/сут в течение 5-10 дней.

Побочное действие:

Не описаны.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Применение возможно согласно режиму дозирования.

Источник: http://drugs.thead.ru/Baktisporin