

## Бактисубтил



### Код АТХ:

- [A07FA](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Капсулы** твердые желатиновые, корпус и крышечка белого цвета; содержимое капсул - аморфный порошок бело-серого или бело-желтого цвета, со специфическим запахом.

	<b>1 капс.</b>
лиофильно высушенные споры <i>Bacillus cereus</i> IP 5832	35 мг

*Вспомогательные вещества:* кальция карбонат - 25 мг, каолин - 100 мг.

*Состав оболочки капсулы:* титана диоксид (E171), желатин.

20 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Эубиотик. Бактерии *Bacillus cereus* IP 5832 выделяют антибактериальные вещества широкого спектра действия, подавляющие развитие патогенных и условно патогенных бактерий, оказывающие противомикробное, противодиарейное действие, восстанавливает кишечную микрофлору. Споры бактерий, содержащиеся в препарате, устойчивы к действию желудочного сока. Их прорастание в вегетативные формы бактерий происходит в кишечнике.

#### Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Бактисубтил не предоставлены.

### Показания к применению:

— лечение острой и хронической диареи различного генеза;

— лечение колитов, энтероколитов;

— профилактика и лечение дисбактериозов кишечника (в т.ч. развившихся в результате антибиотико- или химио-, или радиотерапии).

## Относится к болезням:

- [Дисбактериоз](#)
- [Колит](#)
- [Энтерит](#)

## Противопоказания:

— первичные иммунодефициты;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Бактисубтил назначают **детям старше 7 лет и взрослым.**

**Детям старше 7 лет** назначают по 1-2 капсулы 2-3 раза/сут в течение 7-10 сут.

**Подросткам и взрослым** назначают по 2 капсулы 2-4 раза/сут в течение 7-10 сут.

Бактисубтил следует принимать за 1 ч до еды.

Нельзя запивать Бактисубтил горячей жидкостью или принимать его с алкогольными напитками.

## Побочное действие:

При применении препарата в соответствии с рекомендуемым режимом дозирования побочные эффекты не установлены.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о безопасности применения препарата Бактисубтил при беременности не предоставлены.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Пациент должен сообщать лечащему врачу о параллельно принимаемых лекарственных препаратах.

## Особые указания и меры предосторожности:

Препарат применяется по назначению врача. Пациенты не должны принимать препарат бесконтрольно или по совету третьих лиц.

Если при лечении улучшение не наступает в течение 3 дней, то препарат следует отменить.

### **Применение в детском возрасте**

Препарат назначают **детям старше 7 лет.**

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре ниже 25°C.

**Бактисубтил**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Транспортирование: при температуре ниже 25°C.

**Срок годности:**

3 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Baktisubtil>