

Бактодерм



Код АТХ:

- [D08AX](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ Раствор для местного и наружного применения	100 мл
бензалкония хлорид	500 мг
хлоргексидина биглюконат (20% р-р)	200 мг

125 мл - флаконы пластиковые (1) - пачки картонные.
300 мл - флаконы пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Бензалкония хлорид и хлоргексидин являются антисептиками широкого спектра действия, оказывают бактерицидное действие на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, обладают фунгицидным действием на патогенные грибы, в том числе дрожжеподобные рода *Candida albicans*. Антисептическое действие проявляется в течение 1 минуты. Снижение активности препарата в присутствии воспалительного секрета незначительно.

Бактодерм очищает и дезинфицирует кожу, не нарушая целостности кожных покровов, практически не всасывается с поверхности кожи.

Показания к применению:

- лечение инфицированных поражений кожи и слизистых оболочек;
- профилактика инфицирования кожи и слизистых оболочек.

Относится к болезням:

- [Поражения кожи](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно, местно.

Раствор применяется в неразведенном или разведенном виде 1-2 раза в день. Для обработки поверхности кожи используют неразведенный раствор. Для местной обработки слизистых оболочек используют раствор, разведенный водой 1:10. Разведенный раствор готовится непосредственно перед применением и не должен храниться.

Раствор наносится и равномерно распределяется по поверхности кожи или слизистых, затем обильно смывается водой.

Побочное действие:

Сухость кожи и слизистых оболочек, которая уменьшается при тщательном смывании раствора водой; раздражение кожи; контактная экзема.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Какого-либо вредного воздействия, связанного с использованием препарата во время беременности, обнаружено не было: экспертиза тератогенных свойств действующих веществ дала отрицательные результаты; не следует использовать раствор для обработки кожи молочной железы во время грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нельзя применять одновременно с другими местными антисептиками (риск несовместимости или неэффективности). Если предварительно используется мыло, то оно должно тщательно смываться.

Особые указания и меры предосторожности:

При обработке раствором большой площади поверхности кожи, использование раствора под герметической повязкой, на поражённой, в частности, обожжённой коже, на коже недоношенного новорожденного или младенца, существует риск системного действия активных веществ раствора.

Не использовать для промывания слизистых оболочек глаз слухового канала; не применять для дезинфекции хирургических инструментов и оборудования.

После использования необходимо обязательно закрывать флакон крышкой. После вскрытия флакона не хранить раствор длительное время, особенно, если объем флакона превышает 250 мл.

Применение в детском возрасте

При использовании раствора на коже недоношенного новорожденного или младенца, существует риск системного действия активных веществ раствора.

Условия хранения:

При температуре не выше 25°C, в местах недоступных для детей.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Baktoderm>