Баларпан



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Гликозаминогликаны сульфатированные

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капли глазные в виде прозрачного бесцветного раствора, допускается легкая опалесценция.

	1 мл
гликозаминогликаны сульфатированные	100 мкг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода очищенная.

5 мл - флаконы стеклянные (1) в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.
10 мл - флаконы стеклянные (1) в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.
5 мл - флаконы полипропиленовые (1) в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.
10 мл - флаконы полипропиленовые (1) в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.
1.5 мл - тюбик-капельницы (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Действующие вещества - гликозаминогликаны являются естественными компонентами соединительной ткани роговицы. Стимулируют регенеративные процессы роговицы.

Фармакокинетика

Данных нет.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

— эрозии, непроникающие раны роговицы, конъюнктивы и склеры;

— проникающие раны роговицы и склеры после хирургической обработки;

— ожоги роговицы, конъюнктивы, склеры (химические и термические);

— повреждения роговицы в результате хирургических вмешательств (кератотомия, кератомилез, кератопластика, экстракция катаракты);

— синдром «сухого глаза»;

— кератит, в том числе, с изъязвлением роговицы:

— кератоконъюнктивит;

— эпителиально-эндотелиальная дистрофия роговицы;

— при контактной коррекции зрения для улучшения переносимости контактных линз;

— как профилактическое средство при инволюционных изменениях в роговице.

Относится к болезням:

- Катаракта
- Кератит
- Кератоконус
- Конъюнктивит
- Раны
- Склерит

Противопоказания:

— гиперчувствительность к компонентам препарата;

— детский возраст до 18 лет;

— беременность;

— период кормления грудью (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности).

Способ применения и дозы:

При *любых повреждениях роговицы, включая операционные*, - по 1-2 капли 4-5 раз в день в течение 7 дней;

При *кератитах, кератоконъюнктивитах, синдроме "сухого глаза"* - по 1-2 капли 4-5 раз в день в течение 1 месяца;

При *контактной коррекции, первые 3 суток при адаптации к ношению контактных линз* - 2 раза в сутки утром и вечером (после снятия линз) по 2 капли в каждый глаз;

При *длительном ношении контактных линз* - по 1-2 капли утром и вечером в каждый глаз в течение всего периода ношения;

При *инволюционных изменениях в роговице* - по 1-2 капли утром и вечером в течение месяца.

Побочное действие:

Гиперемия конъюнктивы, аллергические реакции.

Передозировка:

Данные о предозировке препарат отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано в период беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Фармакологическое взаимодействие с другими препаратами не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 18 лет.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре не выше 15°С. Хранить в недоступном для детей месте. После вскрытия флакона препарат можно использовать не более чем в течение 15 суток.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Balarpan