

## Баларпан



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гликозаминогликаны сульфатированные](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Капли глазные** в виде прозрачного бесцветного раствора, допускается легкая опалесценция.

	<b>1 мл</b>
гликозаминогликаны сульфатированные	100 мкг

*Вспомогательные вещества:* натрия хлорид, вода очищенная.

5 мл - флаконы стеклянные (1) в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.  
10 мл - флаконы стеклянные (1) в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.  
5 мл - флаконы полипропиленовые (1) в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.  
10 мл - флаконы полипропиленовые (1) в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.  
1.5 мл - тубик-капельницы (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Действующие вещества - гликозаминогликаны являются естественными компонентами соединительной ткани роговицы. Стимулируют регенеративные процессы роговицы.

#### Фармакокинетика

Данных нет.

### Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

- эрозии, непроникающие раны роговицы, конъюнктивы и склеры;
- проникающие раны роговицы и склеры после хирургической обработки;
- ожоги роговицы, конъюнктивы, склеры (химические и термические);

- повреждения роговицы в результате хирургических вмешательств (кератотомия, кератомилез, кератопластика, экстракция катаракты);
- синдром «сухого глаза»;
- кератит, в том числе, с изъязвлением роговицы:
- кератоконъюнктивит;
- эпителиально-эндотелиальная дистрофия роговицы;
- при контактной коррекции зрения для улучшения переносимости контактных линз;
- как профилактическое средство при инволюционных изменениях в роговице.

### **Относится к болезням:**

- [Катаракта](#)
- [Кератит](#)
- [Кератоконус](#)
- [Конъюнктивит](#)
- [Раны](#)
- [Склерит](#)

### **Противопоказания:**

- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст до 18 лет;
- беременность;
- период кормления грудью (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности).

### **Способ применения и дозы:**

При любых повреждениях роговицы, включая операционные, - по 1-2 капли 4-5 раз в день в течение 7 дней;

При кератитах, кератоконъюнктивитах, синдроме "сухого глаза" - по 1-2 капли 4-5 раз в день в течение 1 месяца;

При контактной коррекции, первые 3 суток при адаптации к ношению контактных линз - 2 раза в сутки утром и вечером (после снятия линз) по 2 капли в каждый глаз;

При длительном ношении контактных линз - по 1-2 капли утром и вечером в каждый глаз в течение всего периода ношения;

При инволюционных изменениях в роговице - по 1-2 капли утром и вечером в течение месяца.

### **Побочное действие:**

Гиперемия конъюнктивы, аллергические реакции.

### **Передозировка:**

Данные о передозировке препарат отсутствуют.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказано в период беременности и в период лактации.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Фармакологическое взаимодействие с другими препаратами не выявлено.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказано детям до 18 лет.

## **Условия хранения:**

В защищенном от света месте при температуре не выше 15°C. Хранить в недоступном для детей месте. После вскрытия флакона препарат можно использовать не более чем в течение 15 суток.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Balarpan>