

Баларпан



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гликозаминогликаны сульфатированные](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Капли глазные в виде прозрачного бесцветного раствора, допускается легкая опалесценция.

	1 мл
гликозаминогликаны сульфатированные	100 мкг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода очищенная.

5 мл - флаконы стеклянные (1) в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.
10 мл - флаконы стеклянные (1) в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.
5 мл - флаконы полипропиленовые (1) в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.
10 мл - флаконы полипропиленовые (1) в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.
1.5 мл - тубик-капельницы (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Действующие вещества - гликозаминогликаны являются естественными компонентами соединительной ткани роговицы. Стимулируют регенеративные процессы роговицы.

Фармакокинетика

Данных нет.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

- эрозии, непроникающие раны роговицы, конъюнктивы и склеры;
- проникающие раны роговицы и склеры после хирургической обработки;
- ожоги роговицы, конъюнктивы, склеры (химические и термические);

- повреждения роговицы в результате хирургических вмешательств (кератотомия, кератомилез, кератопластика, экстракция катаракты);
- синдром «сухого глаза»;
- кератит, в том числе, с изъязвлением роговицы:
- кератоконъюнктивит;
- эпителиально-эндотелиальная дистрофия роговицы;
- при контактной коррекции зрения для улучшения переносимости контактных линз;
- как профилактическое средство при инволюционных изменениях в роговице.

Относится к болезням:

- [Катаракта](#)
- [Кератит](#)
- [Кератоконус](#)
- [Конъюнктивит](#)
- [Раны](#)
- [Склерит](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст до 18 лет;
- беременность;
- период кормления грудью (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности).

Способ применения и дозы:

При любых повреждениях роговицы, включая операционные, - по 1-2 капли 4-5 раз в день в течение 7 дней;

При кератитах, кератоконъюнктивитах, синдроме "сухого глаза" - по 1-2 капли 4-5 раз в день в течение 1 месяца;

При контактной коррекции, первые 3 суток при адаптации к ношению контактных линз - 2 раза в сутки утром и вечером (после снятия линз) по 2 капли в каждый глаз;

При длительном ношении контактных линз - по 1-2 капли утром и вечером в каждый глаз в течение всего периода ношения;

При инволюционных изменениях в роговице - по 1-2 капли утром и вечером в течение месяца.

Побочное действие:

Гиперемия конъюнктивы, аллергические реакции.

Передозировка:

Данные о передозировке препарат отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано в период беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Фармакологическое взаимодействие с другими препаратами не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 18 лет.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре не выше 15°C. Хранить в недоступном для детей месте. После вскрытия флакона препарат можно использовать не более чем в течение 15 суток.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Balarpan>