

## Бальзам Шостаковского



### **Код АТХ:**

- [D08AX](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Поливинокс](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр<sup>МНН</sup>](#) [Википедия<sup>МНН</sup>](#)

[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com<sup>англ</sup>](#)

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Средство, улучшающее регенерацию тканей с противовоспалительным эффектом. Оказывает также противомикробное, местное противовоспалительное и обволакивающее действие.

При наружном применении способствует очищению ран, эпителизации, регенерации тканей.

### **Показания к применению:**

Для наружного применения: фурункулы, карбункулы, трофические язвы, гнойные раны, маститы, ранения мягких тканей, ожоги, отморожения, воспалительные заболевания кожи.

Для приема внутрь: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, колит.

### **Относится к болезням:**

- [Карбункул](#)
- [Колит](#)
- [Мастит](#)
- [Ожоги](#)
- [Раны](#)
- [Фурункул](#)

- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к поливиноксусу.

**Способ применения и дозы:**

Применяют наружно, смачивая салфетки или нанося непосредственно на раневую поверхность.

При приеме внутрь разовая доза - 1.4 г, частота приема - 3-5 раз/сут.

**Побочное действие:**

Возможно: аллергические реакции.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

При беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно наружное применение, прием внутрь не рекомендуется.

**Особые указания и меры предосторожности:**

При беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно наружное применение, прием внутрь не рекомендуется.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Balzam\\_Shostakovskogo](http://drugs.thead.ru/Balzam_Shostakovskogo)