Батрафен (гель)



Код АТХ:

- D01AE14

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Циклопирокс

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковое средство широкого спектра действия. Оказывает бактериостатическое действие. Активен в отношении дерматомицетов, дрожжеподобных, плесневых и других видов грибов, а также в отношении некоторых штаммов грамотрицательных и грамположительных бактерий.

Показания к применению:

Для наружного и местного применения: лечение заболеваний кожи и влагалища, вызванных чувствительными к циклопироксу возбудителями; профилактика грибковых инфекций.

Относится к болезням:

- Инфекции

Противопоказания:

Беременность, лактация (следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания), повышенная чувствительность к циклопироксу.

Способ применения и дозы:

Применяют наружно или местно 1-2 раза/сут. Доза и длительность лечения зависят от показаний и используемой лекарственной формы.

Побочное действие:

В редких случаях: зуд и жжение.

Возможно: покраснение и шелушение кожи около пораженного ногтя.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности, в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение циклопирокса у детей младшего возраста возможно только по строгим показаниям. При грибковых поражениях влагалища рекомендуется одновременное лечение половых партнеров. Следует избегать попадания циклопирокса в глаза. Во время лечения онихомикозов не рекомендуется пользоваться косметическими лаками для ногтей.

Применение в детском возрасте

Применение циклопирокса у детей младшего возраста возможно только по строгим показаниям.

Источник: http://drugs.thead.ru/Batrafen_gel