

[Батроксобин](#)



Код АТХ:

- [B02BX03](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Батроксобин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гематотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Мономолекулярный тромболитический препарат, снижает содержание фибриногена, вязкость крови, улучшает кровоснабжение тканей и органов.

Батроксобин - синтетический аналог токсина змеи Clotalide Bathrops atrox moojeni, представляет собой раствор гликопептида (мономолекулярная серинпротеиназа) с молекулярной массой 36 000 Дальтон.

Показания к применению:

- инсульт острый ишемический;
- ишемический синдром на фоне облитерирующего атеросклероза;
- нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции (в т.ч. острая нейросенсорная тугоухость, вибрационная болезнь).

Относится к болезням:

- [Атеросклероз](#)
- [Инсульт](#)
- [Тугоухость](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность (в т.ч. в анамнезе);
- склонность к кровотечениям (концентрация фибриногена ниже 1 г/л);
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в фазе обострения);
- геморрагический инсульт (в т.ч. подозрение на него);
- сопутствующая терапия антикоагулянтами и тромболитическими лекарственными средствами;
- послеоперационный период;
- тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность;
- разрыв сосочковых мышц и перфорация межжелудочковой перегородки сердца;
- кардиогенный шок;
- полиорганная недостаточность;
- хирургические вмешательства и инвазивные процедуры и методы диагностики (в т.ч. блокада звездчатых нервных узлов, пункция артерий и глубоких вен, экстракция зубов и др.);
- детский возраст (безопасность и эффективность не изучены).

С осторожностью: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в анамнезе), цереброваскулярные заболевания (в анамнезе), пожилой возраст (старше 70 лет), склонность к аллергическим реакциям, беременность, период лактации.

Способ применения и дозы:

В/в капельно.

При *остром инфаркте мозга* - 20 ЕД в течение первых 24 ч или 10 ЕД через 24 ч после начала болезни, поддерживающая доза (по состоянию больного) - обычно 5-10 ЕД через день, всего 3 инъекции на курс. При необходимости курс можно повторить.

При *хронических ишемических расстройствах и нарушениях микроциркуляции* начальная доза - 10 ЕД, поддерживающая - 5 ЕД через день; рекомендуется проведение 3-6 курсов.

Перед введением препарат разводится в 100 мл 0.9% раствора натрия хлорида. Продолжительность инфузии должна составлять не менее 1 ч.

Побочное действие:

Головная боль, головокружение, шум в ушах, кожная сыпь, лихорадка; *иногда* - локальное кровотечение или слабовыраженный экхимоз в месте введения; *редко* - носовое кровотечение, тошнота, рвота, неприятные ощущения в области эпигастрия, повышение активности печеночных трансаминаз, уровня мочевины крови, С-реактивного белка в крови, положительная реакция на скрытую кровь в моче, анафилактический шок.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью: беременность, период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Во время лечения следует постоянно контролировать уровень фибриногена в крови и осуществлять клиническое наблюдение за больными. Если после однократного введения препарата концентрация фибриногена ниже 1 г/л или в процессе лечения появляется кровотечение или подозрение на него, препарат отменяют и осуществляют гемостатические мероприятия.

На месте пункции мелких и поверхностных вен следует накладывать тугую повязку.

В случае необходимости оперативных вмешательств (в т.ч. экстракции зуба) следует информировать врачей о применении препарата.

В период лечения больные должны особенно избегать повреждения кожных покровов и травм.

При нарушениях функции почек

Противопоказание: тяжелая почечная недостаточность.

При нарушениях функции печени

Противопоказание: тяжелая печеночная недостаточность.

Применение в пожилом возрасте

С осторожностью: пожилой возраст (старше 70 лет).

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Batroksobin>