

Базирон АС



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бензоила пероксид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Гель для наружного применения 2.5%	1 г
бензоил пероксид	25 мг

Вспомогательные вещества: натрия гидроксид, вода дистиллированная, кремний коллоидный безводный, динатрия эдетат, пропиленгликоль, полоксамер 182, акрилата кополимер, карбомер 940 (карбополь 980), натрия диоктилсульфосукцинат, глицерол.

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

40 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Гель для наружного применения 5%	1 г
бензоил пероксид	50 мг

Вспомогательные вещества: натрия гидроксид, вода дистиллированная, кремний коллоидный безводный, динатрия эдетат, пропиленгликоль, полоксамер 182, акрилата кополимер, карбомер 940 (карбополь 980), натрия диоктилсульфосукцинат, глицерол.

40 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Гель для наружного применения 10%	1 г
бензоил пероксид	100 мг

Вспомогательные вещества: натрия гидроксид, вода дистиллированная, кремний коллоидный безводный, динатрия эдетат, пропиленгликоль, полоксамер 182, акрилата кополимер, карбомер 940 (карбополь 980), натрия диоктилсульфосукцинат, глицерол.

40 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Бензоила пероксид проявляет противомикробную активность в отношении *Propionibacterium acnes* и *Staphylococcus epidermidis*. Оказывает кератолитическое действие, улучшает оксигенацию тканей, подавляет продукцию кожного сала в сальных железах.

Фармакокинетика

Проникновение бензоила пероксида через кожу низко. Основная часть бензоила пероксида превращается в бензойную кислоту, которая после абсорбции попадает в системный кровоток и быстро выводится почками. Отсутствует кумуляция в тканях. Накожное применение Базирона АС в терапевтических дозах не приводит к побочным эффектам системного действия.

Показания к применению:

— угревая сыпь.

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к одному из входящих ингредиентов препарата;

— детский возраст до 12 лет.

Способ применения и дозы:

Наружно. Легким прикосновением равномерно наносить гель на пораженную поверхность 1 или 2 раза в день (утром и вечером) на чистую сухую кожу. Терапевтический эффект развивается после 4 недель лечения, стойкое улучшение после 3-х месячного лечения.

Повторный курс лечения возможен после консультации с врачом.

Побочное действие:

В редких случаях местное раздражение (покраснение, шелушение, сухость кожи, чувство жжения). В таких случаях рекомендуется сократить частоту применения.

В редких случаях может возникать аллергический контактный дерматит.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Контролируемых клинических испытаний применения препарата при беременности и лактации не проводилось. За длительное время клинического применения Базирона АС не было отмечено случаев токсического действия на плод или пороков развития. Применение геля Базирона АС при беременности и кормлении грудным молоком возможно в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Особые указания и меры предосторожности:

Избегать попадания Базирона АС геля на слизистые оболочки глаз, рта и носа. При случайном попадании препарата на слизистые тщательно промыть их теплой водой.

Не рекомендуется одновременное использование средств с отшелушивающим, подсушивающим или раздражающим эффектом (например средства, содержащие спирт).

Не рекомендуется солнечное и ультрафиолетовое облучение, которые являются дополнительной причиной раздражения кожи.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

При температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Baziron_AS