

## Бекарбон



### Код АТХ:

- [A03BA04](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Белладонны листьев экстракт](#)
- [Натрия гидрокарбонат](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Вегетотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат, оказывает спазмолитическое и антацидное действие.

Белладонна оказывает спазмолитическое (м-холиноблокирующее) действие. Препятствует стимулирующему действию ацетилхолина; уменьшает секрецию слюнных, желудочных, бронхиальных, слезных, потовых желез, поджелудочной железы. Снижает тонус мышц ЖКТ, желчных протоков и желчного пузыря; вызывает тахикардию, улучшает АВ-проводимость. Расширяет зрачки, затрудняет отток внутриглазной жидкости, повышает внутриглазное давление, вызывает паралич аккомодации.

Натрия гидрокарбонат при приеме внутрь взаимодействует с соляной кислотой желудочного сока, нейтрализуя ее. Увеличивает выведение натрия и хлора, осмотический диурез, сдвигает в щелочную сторону реакцию бронхиальной слизи, повышает бронхиальную секрецию, делает мокроту менее вязкой, улучшает ее отхаркивание.

## Показания к применению:

- кишечная колика;
- гиперацидный гастрит;
- изжога;
- диспепсия.

## Относится к болезням:

- [Диспепсия](#)
- [Изжога](#)
- [Кишечная колика](#)
- [Кишечные колики](#)

## Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- закрытоугольная глаукома;
- гипертрофия предстательной железы с нарушением оттока мочи.

## Способ применения и дозы:

Внутрь, за 30-40 мин до еды, по 1 таб. 2-3 раза/сут.

Высшая разовая доза для **взрослых** - 5 таб., высшая суточная доза - 15 таб.

## Побочное действие:

Сухость во рту, жажда, атония кишечника, задержка мочи, тахикардия, мидриаз, парез аккомодации.

## Передозировка:

*Симптомы:* психомоторное возбуждение, судороги, парез аккомодации, острая задержка мочи.

## Особые указания и меры предосторожности:

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания, быстроты психомоторных реакций и хорошего зрения.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Bekarbon>