Бекарбон



Код АТХ:

- A03BA04

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Белладонны листьев экстракт
- Натрия гидрокарбонат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Вегетотропные средства
- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает спазмолитическое и антацидное действие.

Белладонна оказывает спазмолитическое (м-холиноблокирующее) действие. Препятствует стимулирующему действию ацетилхолина; уменьшает секрецию слюнных, желудочных, бронхиальных, слезных, потовых желез, поджелудочной железы. Снижает тонус мышц ЖКТ, желчных протоков и желчного пузыря; вызывает тахикардию, улучшает AV-проводимость. Расширяет зрачки, затрудняет отток внутриглазной жидкости, повышает внутриглазное давление, вызывает паралич аккомодации.

Натрия гидрокарбонат при приеме внутрь взаимодействует с соляной кислотой желудочного сока, нейтрализуя ее. Увеличивает выведение натрия и хлора, осмотический диурез, сдвигает в щелочную сторону реакцию бронхиальной слизи, повышает бронхиальную секрецию, делает мокроту менее вязкой, улучшает ее отхаркивание.

Показания к применению:

— кишечная колика;

— гиперацидный гастрит;

— изжога;

— диспепсия.

Относится к болезням:

- Диспепсия
- Изжога
- Кишечная колика
- Кишечные колики

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— закрытоугольная глаукома;

— гипертрофия предстательной железы с нарушением оттока мочи.

Способ применения и дозы:

Внутрь, за 30-40 мин до еды, по 1 таб. 2-3 раза/сут.

Высшая разовая доза для **взрослых** - 5 таб., высшая суточная доза - 15 таб.

Побочное действие:

Сухость во рту, жажда, атония кишечника, задержка мочи, тахикардия, мидриаз, парез аккомодации.

Передозировка:

Симптомы: психомоторное возбуждение, судороги, парез аккомодации, острая задержка мочи.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания, быстроты психомоторных реакций и хорошего зрения.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bekarbon